5952_0615_CiproD750_560x180_Denk 20.08.15 10:28 Seite 1

Il est préférable d'éviter de prendre Cipro-Denk 750 pendant la grossesse. Avertissez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez une grossesse. Ne prenez pas Cipro-Denk 750 si vous allaitez car la ciprofloxacine est excrétée dans le lait maternel et peut être dangereuse pour votre enfant.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Cipro-Denk 750 peut vous rendre moins réactif. Certains des effets indésirables peuvent concerner le système nerveux. Par conséquent, assurez-vous de connaître les effets que Cipro-Denk 750 a sur vous avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine. En cas de doute, demandez à votre médecin.

3. Comment prendre Cipro-Denk 750

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin vous expliquera exactement quelle quantité de Cipro-Denk 750 vous devez prendre, ainsi que la fréquence des prises et la durée totale du traitement. Cela dépendra du type et de la sévérité de l'infection dont vous êtes atteint(e).

La dose recommandée est de :
Le tableau suivant fournit les valeurs indicatives pour l'utilisation chez l'adulte. Pour toute autre indication autorisée et pour l'utilisation chez l'enfant par des médecins spécialisés, la posologie, la fréquence d'administration et la durée de la prise doivent être définies par votre médecin.

Indications thérapeutique	Dose journalière	Durée du traitement
Infections des voies respiratoires, des oreilles et des sinus	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour jusqu'à 750 mg ciprofloxacine deux fois par jour	7 à 14 jours
Otite externe	750 mg ciprofloxacine deux fois par jour	28 jours à 3 mois
Cystite non compliquée	250 mg ciprofloxacine deux fois par jour jusqu'à 500 mg ciprofloxacine deux fois par jour	3 jours
	Chez les femmes pré-ménopausées, une dose unique de 500 mg peut être utilisée.	
Cystite compliquée, pyélonéphrite non compliquée	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour	7 jours
Pyélonéphrite compliquée	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour jusqu'à 750 mg ciprofloxacine deux fois par jour	Au moins 10 jours à plus de 21 jours
Prostatite	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour jusqu'à 750 mg ciprofloxacine deux fois par jour	2 à 4 semaines (aiguë) jusqu'à 4 à 6 semaines (chronique)
Urétrite et cervicite gonococciques	500 mg ciprofloxacine en dose unique	1 jour (dose unique)
Orchi-épididymite et maladie inflammatoire pelvienne	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour jusqu'à 750 mg ciprofloxacine deux fois par jour	Au moins 14 jours
Infections du tractus gastro-intestinal	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour	1 jour à 7 jours, dépendant du microbe
Infections intra-abdominales	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour jusqu'à 750 mg ciprofloxacine deux fois par jour	5 à 14 jours
Infections de la peau et des tissus mous	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour jusqu'à 750 mg ciprofloxacine deux fois par jour	7 à 14 jours
Infections ostéoarticulaires	500 mg ciprofloxacine deux fois par jour jusqu'à 750 mg ciprofloxacine deux fois par jour	Pas plus de 3 mois
Prophylaxie des infections invasives dues à *Neisseria meningitidis*	500 mg ciprofloxacine en dose unique	1 jour (dose unique)

Veuillez avertir votre médecin si vous souffrez de problèmes rénaux car il peut s'avérer nécessaire d'ajuster votre posologie.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours, mais il peut être plus long en cas d'infections sévères. Prenez toujours Cipro-Denk 750 selon les recommandations de votre médecin. Si vous n'êtes pas sûr(e) de la manière dont vous devez prendre Cipro-Denk 750, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Prenez les comprimés pelliculés en entier (sans les croquer) avec beaucoup d'eau (ou toute autre boisson). Ne les croquez pas, ils ont un goût très désagréable.

La barre de cassure n'est là que pour faciliter la prise du comprimé si vous éprouvez des difficultés à l'avaler en entier.

Si possible, essayez de prendre Cipro-Denk 750 à peu près à la même heure chaque jour.

Vous pouvez prendre Cipro-Denk 750 au cours d'un repas ou bien en dehors des repas.

L'absorption de la substance active n'est que peu modifiée par le calcium contenu dans les plats et aliments. Cependant, ne prenez pas Cipro-Denk 750 avec des produits laitiers, tels que le lait ou les yaourts, ou avec des boissons enrichies en minéraux (par ex. jus d'orange enrichi en calcium).

Assurez-vous de boire suffisamment au cours du traitement avec Cipro-Denk 750.

Si vous avez pris plus de Cipro-Denk 750 que vous n'auriez dû
Si vous avez pris plus de Cipro-Denk 750 que la dose prescrite, consultez un médecin immédiatement. Si possible, prenez vos comprimés pelliculés ou la boîte avec vous.

Si vous oubliez de prendre Cipro-Denk 750
Prenez la dose habituelle dès que possible, puis continuez le traitement selon la prescription.

Cependant, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée et continuez de prendre vos comprimés comme d'habitude. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Assurez-vous de bien prendre tout votre traitement.

Si vous arrêtez de prendre Cipro-Denk 750
Il est important que vous preniez la totalité de votre traitement même si vous vous sentez mieux au bout de quelques jours. Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, il se peut que votre infection ne soit pas complètement guérie et que les symptômes reviennent ou que votre état s'aggrave. Vous pouvez également développer une résistance à cet antibiotique.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effet indésirables fréquents
(chez 1 à 10 patients traités sur 100) :
– nausées, diarrhea
– douleurs articulaires (enfants)

Effets indésirables peu fréquents
(chez 1 à 10 patients traités sur 1 000) :
– surinfections fongiques
– concentration élevée en granulocytes éosinophiles (un type de globules blancs)
– perte d'appétit (anorexie)
– hyperactivité ou instabilité psychomotrice
– maux de tête, étourdissements, somnolence ou troubles du gout
– vomissements, maux d'estomac, troubles digestifs tels qu'indigestion (sensation d'un estomac plein/de brûlures d'estomac) ou ballonnements
– augmentation de certaines substances dans le sang (transaminases, phosphatase alkaline et [ou] bilirubine)
– éruption cutanée, prurit ou urticaire
– douleurs articulaires (adultes)
– douleurs musculaires et osseuses (p.ex. douleurs des extrémités, douleurs dorsales, douleurs thoraciques), généralement sensation de malaise (asthénie) ou fièvre
– dysfonctionnement rénal

Effets indésirables rares
(chez 1 à 10 patients traités sur 10 000) :
– inflammation de la muqueuse du gros intestin due aux antibiotiques (colite), mortelle dans de très rares cas (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions»)
– modifications de la composition du sang (leucocytopénie, hyperleucocytose, neutropénie, anémie), diminution ou augmentation de certains facteurs de coagulation sanguine (plaquettes et prothrombine),
– réaction allergique, gonflement (oedème) ou gonflement rapide de la peau et des muqueuses (angioedème)
– augmentation du taux de sucre sanguin (hyperglycémie)
– confusion, désorientation, anxiété, cauchemars, dépression (qui peuvent entraîner des pensées suicidaires, des tentatives de suicide ou un suicide accompli) ou hallucinations
– picotements, sensibilité inhabituelle aux stimuli sensoriels, diminution de la sensibilité de la peau, tremblements, convulsions y compris un état de mal épileptique (période prolongée de confusion ou d'agitation) ou vertiges (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »)
– troubles de la vision (incluant vision double)
– bourdonnements dans les oreilles (acouphènes), altération de l'audition ou surdité
– emballement du coeur (tachycardie)
– dilatation des vaisseaux sanguins (vasodilatation), hypotension artérielle ou évanouissement
– essoufflement, incluant les symptômes de l'asthme
– dysfonctionnement hépatique, jaunisse (accumulation de bile) ou inflammation hépatique
– sensibilité à la lumière (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions»)
– douleurs musculaires, inflammation des articulations, augmentation des tensions musculaires et des crampes
– Insuffisance rénale, présence de sang ou de cristaux dans les urines (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »), inflammation des voies urinaires
– rétention hydrique ou sudation excessive
– augmentation des taux d'amylase

Effets indésirables très rares
(chez moins de 1 patient traité sur 10 000) :
– réduction du nombre de globules rouges (anémie hémolytique), grave diminution du nombre de certains globules blancs (agranulocytose), diminution des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes pouvant mettre le pronostic vital en jeu (pancytopénie) et altération de la fonction de la moelle osseuse qui peut également mettre le pronostic vital en jeu (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions»)
– graves réactions allergiques (réaction ou choc anaphylactique, mortel(le) – maladie sérique) (voir rubrique 2 «Avertissements et précautions»)
– troubles psychiatriques (réactions psychotiques, qui peuvent entraîner des pensées suicidaires, des tentatives de suicide ou un suicide accompli) (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »)
– migraine, trouble de la coordination, trouble de la marche (démarche hésitante), altération de l'odorat (trouble olfactif), sensibilité anormalement accrue aux stimuli sensoriels, augmentation de la pression à l'intérieur du crâne (pression cérébrale)
– problèmes de vision des couleurs
– inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins (vascularite)
– inflammation du pancréas (pancréatite)
– mort des cellules hépatiques (nécrose du foie) évoluant, très rarement, vers une insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital
– petits saignements cutanés (pétéchies); diverses modifications de la peau et différents types d'éruptions cutanées (par ex. syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell, qui est parfois mortel)
– faiblesse musculaire, inflammation de tendons, rupture de tendons – particulièrement du grand tendon situé derrière la cheville (le tendon d'Achille) – (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »), aggravation des symptômes de myasthénie gravis (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »)

Fréquence indéterminée
(ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :
– atteintes du système nerveux, telles que douleurs, sensation de brûlure, picotements, étourdissements et (ou) faiblesse des membres (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »)
– rythme cardiaque anormalement rapide, rythme cardiaque irrégulier mettant le pronostic vital en jeu, modification du rythme cardiaque (appelée «allongement de l'intervalle QT» observée sur l'ECG, une mesure de l'activité électrique du coeur) (voir rubrique 2 « Avertissements et précautions »)
– éruption cutanée pustuleuse
– altération de la coagulation sanguine (chez les patients traités par des antagonistes de la vitamine K).

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Cipro-Denk 750

Conserver à une température inférieure à 30 °C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage ou le blister après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Durée de conservation : 3 ans

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Cipro-Denk 750
La substance active est ciprofloxacine.

1 comprimé pelliculé contient 750 mg de ciprofloxacine (sous forme de chlorhydrate de ciprofloxacine).

Les autres composants sont carboxyméthylamidon sodique, hydroxypropylcellulose basse-substituée, magnésium stéarate (Ph.Eur.) [végétale], hypromellose, macrogol 400, talc, dioxyde de titane (E 171).

Conditions de délivrance
Médicament soumis à prescription médicale.

Aspect de Cipro-Denk 750 et contenu de l'emballage extérieur
Comprimés pelliculés blancs, oblongues, entaillés des deux côtés, avec l'inscription « Cipro 750 » sur une face.
Présentations : 10 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché
DENK PHARMA GmbH & Co. KG
Prinzregentenstr. 79
81675 München
Allemagne

Fabricant
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Hildebrandstr. 12
37081 Göttingen
Allemagne

Vers. 5952/06.2015
15/08/77/KB-02
Revision of text: 08.2015

QUALITY FOR HEALTH – MADE IN GERMANY

Cipro-Denk 750

Film coated tablets – oral use
Antibiotic – Fluoroquinolone
Active substance: Ciprofloxacin

For use in adults and children

Package leaflet: Information for the user

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
– Keep this leaflet. You may need to read it again.
– If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
– This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
– If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:

1. What Cipro-Denk 750 is and what it is used for
2. What you need to know before you take Cipro-Denk 750
3. How to take Cipro-Denk 750
4. Possible side effects
5. How to store Cipro-Denk 750
6. Contents of the pack and other information

1. What Cipro-Denk 750 is and what it is used for

Cipro-Denk 750 is an antibiotic belonging to the fluoroquinolone group. The active substance is ciprofloxacin. Ciprofloxacin works by killing bacteria that cause infections. It only works in certain strains of bacteria.

Therapeutic indications
Adults
Cipro-Denk 750 is used in adults to treat the following bacterial infections:
– certain respiratory tract infections
– certain long-lasting or recurring forms of ear or sinus inflammation
– urinary tract infections
– infections of the male and female genitalia
– infections of the gastrointestinal tract and infections of the abdominal cavity
– certain skin and soft-tissue infections
– infections of the bones and joints
– to prevent infections caused by the bacterium *Neisseria meningitidis*
– treatment after inhalation of anthrax pathogens.

Ciprofloxacin may be used in the management of patients with a low number of certain white blood cells (neutropenia) and fever and that is suspected to be due to a bacterial infection.

If you have a severe infection or an infection caused by several types of bacteria, you may be given other antibiotic treatment in addition to Cipro-Denk 750.

Children and adolescents
Cipro-Denk 750 is used in children and adolescents, under the supervision of a specialist doctor, to treat the following bacterial infections:
– lung and bronchial infections in children and adolescents suffering from cystic fibrosis
– complicated urinary tract infections, including infections involving the renal pelvis (pyelonephritis)
– treatment after inhalation of anthrax pathogens.

Cipro-Denk 750 can also be used to treat other specific severe infections in children and adolescents, if your doctor considers this necessary.

2. What you need to know before you take Cipro-Denk 750

Do not take Cipro-Denk 750
– if you are allergic to ciprofloxacin, other quinolone preparations or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6)
– if you are taking tizanidine (see section 2 "Other medicines and Cipro-Denk 750")

Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking Cipro-Denk 750.

Before you take Cipro-Denk 750
Please tell your doctor if you:
– have ever had kidney problems, as your treatment may have to be adjusted
– suffer from epilepsy or other neurological conditions such as cerebral ischemia or stroke.
– have a history of tendon problems during previous treatment with antibiotics such as Cipro-Denk 750
– suffer from myasthenia gravis (a type of muscle weakness)
– have heart problems: Caution should be taken when using this kind of medicine, if you were born with or have family history of prolonged QT interval (seen on ECG, electrical recording of the heart), have salt imbalance in the blood (especially low level of potassium or magnesium in the blood), have a very slow heart rhythm (called 'bradycardia'), have a weak heart (heart failure), have a history of heart attack (myocardial infarction), you are female or elderly or you are taking other medicines that result in abnormal ECG changes (see section "Other medicines and Cipro-Denk 750").
– or a member of your family is known to have a deficiency in a glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), as you may experience a risk of anaemia with Cipro-Denk 750.

For the treatment of certain genital tract infections, your doctor may prescribe another antibiotic in addition to Cipro-Denk 750. If there is no improvement in symptoms after 3 days of treatment, please consult your doctor.

While you take Cipro-Denk 750
Tell your doctor immediately if any of the following events occurs whilst taking Cipro-Denk 750. Your doctor will decide whether treatment with Cipro-Denk 750 needs to be stopped.
– Severe, sudden hypersensitivity reaction (anaphylactic reaction/shock, angioedema). Even after the first dose, there is a slight risk that you may experience a severe allergic reaction, which can manifest in the following symptoms: tight-chestedness, feeling dizzy, nausea or sense of imminent fainting, or feeling dizzy on standing. If this happens, stop taking Cipro-Denk 750 and consult your doctor immediately.
– Pain and swelling in the joints and tendon inflammation may occasionally occur, especially if you are elderly and are also being treated with corticosteroids. Inflammation and ruptures of tendons may occur even within the first 48 hours of treatment or up to several months after discontinuation of Cipro-Denk 750 therapy. At the first sign of pain or inflammation, stop taking Cipro-Denk 750 and rest the painful body part. Avoid any unnecessary exercise, as this can increase the risk of tendon rupture.
– Seizures or a so-called status epilepticus (prolonged state of confusion or excitement) can occur, especially if you suffer from epilepsy or other neurological disorders such as cerebral ischemia or stroke. If this happens, stop taking Cipro-Denk 750 and contact your doctor immediately.
– Psychiatric reactions may occur after taking the first dose of Cipro-Denk 750. If you suffer from depression or psychosis, your symptoms may get worse during treatment with Cipro-Denk 750. In rare cases, a depression or psychosis can progress to suicidal thoughts, suicide attempts or completed suicide. If this happens, stop taking Cipro-Denk 750 and contact your doctor immediately.
– Symptoms of nerve damage may occur, such as pain, burning, tingling, light-headedness and/or weakness. If this happens, stop taking Cipro-Denk 750 and contact your doctor immediately.
– Diarrhoea may occur during treatment with antibiotics, including Cipro-Denk 750, or even several weeks after you have finished treatment. If diarrhoea is severe or persistent, or if you notice that your stool contains blood or mucus, stop taking Cipro-Denk 750 immediately, as this may be life-threatening. Do not take any medicines that stop or slow down bowel movements and consult your doctor.
– Tell the doctor or laboratory staff that you are taking Cipro-Denk 750 if you have to provide a blood or urine sample.
– Please tell your doctor if you suffer from kidney problems, as your dose may need to be adjusted.
– Cipro-Denk 750 can cause liver damage. If you notice any of the following symptoms, such as loss of appetite, jaundice (yellowing of the skin), dark urine, itching, or tenderness of the stomach, stop taking Cipro-Denk 750 and consult your doctor immediately.
– Cipro-Denk 750 may lead to a reduction in the number of white blood cells and your resistance to infections may be decreased. If you experience an infection with symptoms such as fever and a serious deterioration in your general condition, or fever together with local symptoms such as sore infections of the throat/mouth, or pain when passing water, you should consult your doctor immediately. A blood sample may show a possible reduction in white blood cells (agranulocytosis). It is important to tell your doctor about all medicines that you are taking.
– Tell your doctor if you or a member of your family are known to suffer from glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (G6PD), as you will be supervised by your doctor, regarding the risk of anaemia by taking Cipro-Denk 750.
– Your skin will become more sensitive to sunlight or ultraviolet (UV) light when you take Cipro-Denk 750. For this reason, avoid exposure to strong sunlight or artificial UV light such as sun beds.
– If your eyesight becomes impaired or if your eyes seem to be otherwise affected, consult an eye specialist immediately.

Other medicines and Cipro-Denk 750
Tell your doctor or pharmacist if you are taking/using, have recently taken/used or might take/use any other medicines.

Do not take Cipro-Denk 750
together with tizanidine, as this may cause side effects such as low blood pressure and sleepiness (see section 2 "Do not take Cipro-Denk 750").

The following medicines are known to cause interactions with Cipro-Denk 750 in your body. If Cipro-Denk 750 is taken together with these medicines, the therapeutic effect of these medicines may be impaired. The probability of developing side effects may also be increased.

Please tell your doctor if you are taking any of the following medicines:
– vitamin k antagonists (e.g.warfarin) or other oral anticoagulants (blood thinners)
– probenecid (for gout)
– methotrexate (for certain types of cancer, psoriasis, rheumatoid arthritis)
– theophylline (for breathing complaints)
– tizanidine (to relax the musculoskeletal system in multiple sclerosis)
– olanzapine (an antipsychotic)
– clozapine (an antipsychotic)
– ropinirole (for Parkinson's disease)
– phenytoin (for epilepsy)
– metoclopramide (for nausea and vomiting)
– cyclosporin (for skin diseases, rheumatoid arthritis and organ transplantation)
– glibenclamide (for diabetes)
– Other medicines that can alter your heart rhythm: Medicines that belong to the group of anti-arrhythmics (e.g. quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclic antidepressants, some antimicrobials (that belong to the group of macrolides), some antipsychotics.

Cipro-Denk 750 can increase the concentration of the following medicines in your blood:
– pentoxifylline (for circulatory disorders)
– caffeine
– duloxetine (for depression, diabetic nerve damage or incontinence)
– lidocaine (for heart diseases or anaesthetic use)
– sildenafil (e.g. for erectile dysfunction)

Some medicines reduce the effect of Cipro-Denk 750. Please tell your doctor if you are taking or wish to take any of the following medicines:
– antacids (used to treat overacidity of the stomach)
– omeprazole
– mineral supplements
– sucralfate
– a polymeric phosphate binder (e.g. sevelamer)
– medicines or dietary supplements containing calcium, magnesium, aluminium or iron.

If you absolutely need these products, take Cipro-Denk 750 about two hours before or four hours afterwards as a minimum.

Cipro-Denk 750 with food and drink
You can take Cipro-Denk 750 with a meal or independently of meals. Absorption of the active substance is only marginally affected by a meal containing calcium. However, do not take Cipro-Denk 750 with dairy products, such as milk or yoghurt, or with mineral-enriched drinks (e.g. calcium-enriched orange juice).

Please make sure that you drink sufficient liquid during treatment with Cipro-Denk 750.

Pregnancy and breast-feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

You should preferably avoid taking Cipro-Denk 750 during pregnancy. Tell your doctor if you are pregnant or planning a pregnancy. Do not take Cipro-Denk 750 if you are breast feeding, as ciprofloxacin passes into breast milk and may harm your child.

Driving and using machines
Cipro-Denk 750 may make you feel less alert.

Some side effects may occur on the nervous system. Therefore, make sure that you know how you react to Cipro-Denk 750 before driving a vehicle or using machines. If in doubt, please ask your doctor.

3. How to take Cipro-Denk 750

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Your doctor will explain to you exactly how much Cipro-Denk 750 to take, as well as how often and for how long. This will depend on the type and severity of the infection that you have.

The recommended dose is:
The following table provides dosage recommendations for use in adults.

For all other approved indications and for treatment of children by specialist doctors, dosage, frequency and duration of administration are determined by your doctor.

Therapeutic Indication	Daily dose	Duration of treatment
Infections of the respiratory tract, the ears and the sinuses	500 mg ciprofloxacin two times a day up to 750 mg ciprofloxacin two times a day	7 to 14 days
External otitis	750 mg ciprofloxacin two times a day	28 days up to 3 months
Uncomplicated cystitis	250 mg ciprofloxacin two times a day up to 500 mg ciprofloxacin two times a day	3 days
	In pre-menopausal women, 500 mg ciprofloxacin single dose may be used	
Complicated cystitis, uncomplicated pyelonephritis	500 mg ciprofloxacin two times a day	7 days

5952_0615_CiproD750_560x180_Denk 20.08.15 10:28 Seite 2

Complicated pyelonephritis	500 mg ciprofloxacin two times a day up to 750 mg ciprofloxacin two times a day	At least 10 days up to more than 21 days
Prostatitis	500 mg ciprofloxacin two times a day up to 750 mg ciprofloxacin two times a day	2 to 4 weeks (acute) to 4 to 6 weeks (chronic)
Gonococcal urethritis and cervicitis	500 mg ciprofloxacin as single dose	1 day (single dose)
Epididymo-orchitis and pelvic inflammatory disease	500 mg ciprofloxacin two times a day up to 750 mg ciprofloxacin two times a day	At least 14 days
Gastro-intestinal infections	500 mg ciprofloxacin two times a day	1 to 7 days, depending on the pathogen
Intra-abdominal infections	500 mg ciprofloxacin two times a day up to 750 mg ciprofloxacin two times a day	5 to 14 days
Infections of the skin and soft tissues	500 mg ciprofloxacin two times a day up to 750 mg ciprofloxacin two times a day	7 to 14 days
Infections of the bones and joints	500 mg ciprofloxacin two times a day up to 750 mg ciprofloxacin two times a day	No more than 3 months
Prophylaxis of invasive infections caused by *Neisseria meningitidis*	500 mg ciprofloxacin as single dose	1 day (single dose)

Please tell your doctor if you suffer from kidney problems, as your dose may have to be adjusted.

Treatment usually lasts for 5 to 21 days, but may be longer for severe infections. Always take Cipro-Denk 750 exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure how to take Cipro-Denk 750.

Take the film-coated tablets whole (not chewed) with plenty of liquid. You should not chew the film-coated tablets due to their unpleasant taste.

The score line is only there to help you break the tablet if you have difficulty swallowing it whole.

Wherever possible, try to take Cipro-Denk 750 at roughly the same time each day. You can take Cipro-Denk 750 with a meal or independently of meals. Absorption of the active substance is only marginally affected by a meal containing calcium. However, do not take Cipro-Denk 750 with dairy products, such as milk or yoghurt, or with mineral-enriched drinks (e.g. calcium-enriched orange juice).

Please make sure that you drink sufficient liquid during treatment with Cipro-Denk 750.

If you take more Cipro-Denk 750 than you should
If you have taken more than the prescribed dose, seek medical help immediately. If possible, take your film-coated tablets or the pack with you to show the doctor.

If you forget to take Cipro-Denk 750
Take the usual dose as soon as possible and then continue treatment as prescribed. However, if it is almost time for your next dose, do not take the forgotten dose, but continue taking your tablets as normal. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

Please make sure that you finish your full course of treatment.

If you stop taking Cipro-Denk 750
It is important that you finish your full course of treatment even if you feel better after a few days. If you stop taking this medicine too soon, your infection may not be completely cured and symptoms of the infection may return or your condition may get worse. You may also develop resistance to this antibiotic.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Common side effects
(1 to 10 out of 100 patients treated):
– nausea, diarrhoea
– joint pain in children

Uncommon side effects
(1 to 10 out of 1,000 patients treated):
– fungal superinfections
– high concentration of eosinophil granulocytes, certain white blood cells
– loss of appetite (anorexia)
– hyperactivity or restlessness
– headache, light-headedness, sleeping or taste disorders
– vomiting, stomach ache, digestive disorders such as upset stomach (feeling full/heartburn) or wind
– increase in certain substances in the blood (transaminases, alkaline phosphatase and/or bilirubin)
– rash, itching or nettle rash
– joint pain in adults
– muscle and bone pain (e.g. pain of the limbs, back pain, chest pain), generally feeling unwell (asthenia) or fever
– kidney dysfunction

Rare side effects
(1 to 10 out of 10,000 patients treated):
– inflammation of the large bowel lining triggered by antibiotics (colitis), very rarely with a fatal outcome (see section 2 "Warnings and precautions")
– changes in the blood picture (leukocytopenia, leukocytosis, neutropenia, anaemia), decrease or increase in a certain blood coagulation factor (platelets and prothrombin),
– allergic reaction, swelling (oedema) or rapid swelling of the skin and mucous membranes (angioedema)
– increase in blood sugar (hyperglycaemia)
– confusion, disorientation, anxiety, nightmares, depressions (potentially leading to suicidal thoughts, suicide attempts or completed suicide) or hallucinations
– tingling, unusual sensitivity to sensory stimuli, reduced sensitivity of the skin, tremor, seizures including status epilepticus (prolonged state of confusion or excitement) or dizziness (see section 2 "Warnings and precautions")
– visual disturbances, including double vision
– ringing in the ears (tinnitus) or hearing loss or reduced hearing
– racing heart (tachycardia)
– widening of the blood vessels (vasodilation), low blood pressure or fainting
– shortness of breath, including asthmatic symptoms
– liver dysfunction, jaundice (bile accumulation) or liver inflammation
– sensitivity to light (see section 2 "Warnings and precautions")
– muscle pain, inflamed joints, increased muscle tension or cramps
– kidney failure, blood or crystals in the urine (see section 2 "Warnings and precautions"), inflammation of the urinary tract
– fluid retention or excessive sweating
– increased levels of the amylase enzyme

Very rare side effects
(less than 1 in 10,000 patients treated):
– reduced number of certain red blood cells (haemolytic anaemia), a dangerous decrease in certain white blood cells (agranulocytosis), possibly life-threatening decrease in certain red and white blood cells and platelets (pancytopenia) and reduced bone marrow function, which can also be life-threatening (see section 2 "Warnings and precautions")
– severe allergic reactions (anaphylactic reaction or anaphylactic shock, with a fatal outcome serum sickness) (see section 2 "Warnings and precautions")
– psychiatric disorders (psychotic reactions, potentially leading to suicidal thoughts, suicide attempts or a completed suicide) (see section 2 "Warnings and precautions")
– migraine, impaired coordination, unsteady walking (impaired gait), impaired sense of smell (olfactory disorder), abnormally heightened sensitivity to sensory stimuli, increased pressure inside the skull (cerebral pressure)
– problems in colour vision
– inflammation of the blood vessel walls (vasculitis)
– inflammation of the pancreas (pancreatitis)
– liver cell death (liver necrosis), very rarely progressing to life-threatening liver failure
– small, pinpoint bleeding into the skin (petechiae); various skin changes and types of rash (e.g. Stevens-Johnson syndrome or toxic epidermal necrolysis, which is sometimes fatal)
– muscle weakness, inflamed tendons, tendon rupture – especially of the large tendon at the back of the ankle (Achilles tendon) (see section 2 "Warnings and precautions"), worsening of myasthenia gravis symptoms (see section 2 "Warnings and precautions")

Frequency not known
(cannot be estimated from the available data)
– complaints of the nervous system, such as pain, burning, tingling, light-headedness and/or weakness of the limbs (see section 2 "Warnings and precautions")
– abnormal fast heart rhythm, life-threatening irregular heart rhythm, alteration of the heart rhythm (called 'prolongation of QT interval', seen on ECG, electrical activity of the heart) (see section 2 "Warnings and precautions")
– pustular rash
– impairment of blood clotting (in patients, treated with vitamin k anagonists)

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Cipro-Denk 750

Store below 30 °C.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton and blister after "EXP". The expiry date refers to the last day of that month.

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Shelf life: 3 years

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

Pharmacological properties
Pharmacotherapeutic group:
Fluoroquinolones, ATC-Code: J01MA02

Mechanism of action:
As a fluoroquinolone antibiotic, ciprofloxacin has a bactericidal effect based on inhibition of topoisomerase II (DNA-gyrase) and topoisomerase IV. Both enzymes are needed for bacterial DNA replication, transcription, recombination and repair.

Antibacterial spectrum of efficacy:
The prevalence of acquired resistances can vary for certain species with regard to geographical and temporal aspects. Knowledge of the local resistance patterns is therefore of importance, particularly in the treatment of severe infections.

If, due to the local resistance status, the use of ciprofloxacin seems questionable for at least some forms of infection, expert advice should be sought.

Commonly susceptible species are:
– Aerobic Gram-positive microorganisms like *Bacillus anthracis* and *Staphylococcus saprophyticus*,
– Aerobic Gram-negative microorganisms like *Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloaceae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, Proteus vulgaris, Salmonella enterica (incl. S. typhi/parathyphi), Serrratia marcescens* and *Shigella ssp.*
– Other microorganism like *Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma hominis* and *Mycoplasma pneumoniae.*

Species in which acquired restistance may pose a problem during use:
Enterococcus faecalis, some subspecies of *Staphylococcus aureus,* and some aerobic *Gram-negative microorganisms.*

Inherently resistant species are:
Enterococcus faecium, Stenotrophomas maltophilia, Bacteroides ssp., Clostridium difficile, Treponema pallidum and *Ureaplasma urealyticum.*

Pharmacokinetic properties
Absorption
After oral administration of single doses of 250 mg, 500 mg and 750 mg ciprofloxacin tablets, ciprofloxacin is absorbed rapidly and extensively, mainly from the small intestine, reaching maximum serum concentrations after 1 –2 hours.

Single doses of 100 –750 mg produced dose-dependent peak serum concentrations (Cmax) between 0.56 and 3.7 mg/L. Serum concentrations increase proportionately with doses up to 1000 mg.

The absolute bioavailability is approximately 70 – 80 %.

It has been shown that an oral dose of 500 mg every 12 hours leads to an area under the serum concentration-time curve (AUC) equivalent to that after intravenous infusion of 400 mg ciprofloxacin, administered over 60 minutes every 12 hours.

Distribution
The protein binding of ciprofloxacin is low (20 – 30 %). Ciprofloxacin is primarily found in non-ionised form in the blood plasma and has a huge distribution volume at steadystate of 2 – 3 l/kg body weight. Ciprofloxacin reaches high concentrations in certain body fluids and tissues like lung tissue (epithelial fluid, alveolar macrophages, biopsy tissue), paranasal sinuses, inflamed lesions (cantharides blister fluid) and the urogenital tract (urine, prostate, endometrium), where total concentrations exceeding those of plasma concentrations are reached.

Metabolism
Low concentrations of four metabolites were found, which were identified as: desethylene ciprofloxacin (M1), sulfociprofloxacin (M2), oxociprofloxacin (M3) and formylciprofloxacin (M4). The metabolites exhibit an antibacterial effect *in vitro,* but which is considerably lower than that of the parent substance.

Ciprofloxacin is known to be a moderate inhibitor of the CYP 450 1A2 isoenzyme.

Elimination
Ciprofloxacin is largely excreted unchanged both renally and, to a lesser degree, via the faeces. The serum elimination half-life in patients with normal renal function is approximately 4 to 7 hours.

What Cipro-Denk 750 contains
The active substance is ciprofloxacin.

One film-coated tablet contains 750 mg ciprofloxacin (as ciprofloxacin hydrochloride).

The other ingredients are: sodium starch glycolate, low-substituted hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate (Ph.Eur.) [vegetable], hypromellose, macrogol 400, talc, titanium dioxide (E 171).

General classification for supply
Medicinal product subject to medical prescription

What Cipro-Denk 750 looks like and contents of the pack
White, oblong film-coated tablets with a score on both sides and imprint "Cipro 750" on one side.
Pack size: 10 film-coated tablets

Marketing authorisation holder
DENK PHARMA GmbH & Co. KG
Prinzregentenstr. 79
81675 München
Germany

Manufacturer
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Hildebrandstr. 12
37081 Göttingen
Germany

Denk Pharma — LA QUALITÉ AU SERVICE DE LA SANTÉ - FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Cipro-Denk 750

Comprimés pelliculés – voie orale
Antibiotique – Fluoroquinolone
Principe actif : Ciprofloxacine

Pour utilisation chez l'adulte et l'enfant

Notice : Information de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce medicament car elle contient des informations importantes pour vous.
– Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
– Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
– Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
– Si vous ressentez une quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. **Qu'est-ce que Cipro-Denk 750 et dans quel cas est-il utilisé**
2. **Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cipro-Denk 750**
3. **Comment prendre Cipro-Denk 750**
4. **Quels sont les effets indésirables éventuels**
5. **Comment conserver Cipro-Denk 750**
6. **Contenu de l'emballage et autres informations**

1. Qu'est-ce que Cipro-Denk 750 et dans quel cas est-il utilisé

Cipro-Denk 750 est un antibiotique appartenant au groupe des fluoroquinolones. La substance active est la ciprofloxacine. La ciprofloxacine tue les bactéries qui sont à l'origine des infections, mais elle agit uniquement sur certaines souches.

Indications thérapeutiques
Chez l'adulte
Cipro-Denk 750 est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :
– certaines infections des voies respiratoires
– certaines formes (longues ou récurrentes) d'inflammation des oreilles ou des sinus
– infections des voies urinaires
– infections des organes génitaux externes des hommes et des femmes
– infections du tractus gastro-intestinal et infections de la cavité abdominale
– certaines infections de la peau et des tissus mous
– infections ostéoarticulaires
– infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis* (prévention)
– inhalation d'agents pathogènes responsables de la maladie du charbon.

La ciprofloxacine peut être utilisée pour le traitement des patients présentant un nombre réduit de certains globules blancs (neutropénie) et de la fièvre dont l'origine bactérienne est suspectée.

Si votre infection est sévère ou due à plusieurs types de bactéries, il est possible que vous receviez un autre antibiotique en plus de Cipro-Denk 750.

Chez l'enfant et l'adolescent
Cipro-Denk 750 est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous la supervision d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :
– infections des poumons et des bronches chez les enfants et les adolescents atteints de mucoviscidose
– infections des voies urinaires compliquées, incluant les infections du pelvis renal (pyélonéphrite)
– inhalation d'agents pathogènes responsables de la maladie du charbon.

Cipro-Denk 750 peut également être utilisé pour d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et l'adolescent, si votre médecin le juge nécessaire.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cipro-Denk 750

Ne prenez jamais Cipro-Denk 750
– si vous êtes allergique à la ciprofloxacine, à d'autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
– si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 « Autres médicaments et Cipro-Denk 750 »)

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Cipro-Denk 750.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cipro-Denk 750
Veuillez prévenir votre médecin si :
– vous avez déjà eu des problèmes rénaux car votre traitement pourrait nécessiter un ajustement
– vous souffrez d'épilepsie ou d'autres atteintes neurologiques telles qu'une ischémie cérébrale ou un accident vasculaire cérébral
– vous avez déjà eu des problèmes au niveau des tendons au cours d'un précédent traitement avec des antibiotiques comme Cipro-Denk 750
– vous souffrez de myasthénie gravis (une sorte de faiblesse musculaire)
– vous avez des problèmes cardiaques : Faites attention lorsque vous prenez ce genre de médicament si vous souffrez du syndrome du QT long congénital ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé à l'ECG, un enregistrement de l'activité électrique du coeur), si vous prenez un désequilibre électrolytique (notamment de faibles taux de potassium ou de magnésium dans le sang), si votre rythme cardiaque est très lent (bradycardie), si votre coeur est faible (insuffisance cardiaque), si vous avez des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme ou une personne âgée, ou si vous prenez d'autres médicaments qui provoquent des modifications anormales de l'ECG (voir rubrique 2 « Autres médicaments et Cipro-Denk 750 »).
– vous ou un membre de votre famille êtes atteint d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) car vous pourriez alors risquer de présenter une anémie avec Cipro-Denk 750.

Pour le traitement de certaines infections des organes génitaux, votre médecin peut vous prescrire un autre antibiotique en complément de la ciprofloxacine. Veuillez vous adresser à votre médecin en l'absence d'amélioration des symptômes après 3 jours de traitement.

Au cours du traitement par Cipro-Denk 750
Prévenez votre médecin immédiatement si l'un des évènements suivants se produit pendant que vous prenez Cipro-Denk 750. Il décidera d'interrompre, ou non, votre traitement par Cipro-Denk 750.
– Réaction d'hypersensibilité soudaine et sévère (réaction/choc anaphylactique, angioedème). Même après la première prise, il existe un léger risque de développer une réaction allergique sévère qui peut se manifester par les symptômes suivants : oppression thoracique, vertiges, nausées ou impression que vous allez vous évanouir, vertiges en position debout. Si cela se produit, arrêtez de prendre Cipro-Denk 750 et consultez votre médecin immédiatement.
– Douleurs et gonflement des articulations, et inflammation des tendons peuvent se produire de temps en temps, surtout si vous êtes âgé(e) et prenez également des corticostéroïdes. Des inflammations et des ruptures des tendons peuvent survenir dès les premières 48 heures après le début du traitement ou encore plusieurs mois après le traitement par Cipro-Denk 750. Au premier signe de douleur ou d'inflammation, arrêtez de prendre Cipro-Denk 750 et mettez la partie de votre corps qui est douloureuse au repos. Évitez tout exercice non nécessaire car cela peut augmenter le risque de rupture de tendons.
– Des crises convulsives ou un état de mal épileptique (période prolongée de confusion ou d'agitation) peuvent survenir, en particulier si vous souffrez d'épilepsie ou d'autres troubles neurologiques (par ex. ischémie cérébrale ou accident vasculaire cérébral). Si cela arrive, arrêtez de prendre Cipro-Denk 750 et consultez votre médecin immédiatement.
– Des réactions psychiatriques peuvent se produire après la première prise de Cipro-Denk 750. Si vous souffrez de dépression ou de psychose, il est possible que vos symptômes s'aggravent au cours du traitement avec Cipro-Denk 750. Dans de rares cas, une dépression ou une psychose peut entraîner des pensées suicidaires, des tentatives de suicide ou un suicide accompli. Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre Cipro-Denk 750 et consultez votre médecin immédiatement.
– Des symptômes de lésions nerveuses, tels que douleur, sensation de brûlure, picotements, étourdissements et (ou) faiblesse, peuvent se produire. Si cela arrive, arrêtez de prendre Cipro-Denk 750 et consultez votre médecin immédiatement.
– Une diarrhée peut apparaître au cours d'une antibiothérapie, voire même plusieurs semaines après la fin du traitement, y compris avec Cipro-Denk 750. Si elle est sévère ou persiste, ou si vous remarquez que vos selles contiennent du sang ou du mucus, arrêtez de prendre Cipro-Denk 750 immédiatement car cela peut mettre votre vie en danger. Ne prenez aucun médicament qui arrête ou ralentisse le transit intestinal, et consultez votre médecin.
– Prévenez le médecin ou le personnel du laboratoire que vous prenez Cipro-Denk 750 si l'on doit vous prélever un échantillon de sang ou d'urine.
– Si vous souffrez de problèmes rénaux, veuillez informer votre médecin, car il faudra, le cas échéant, adapter votre dose.
– Cipro-Denk 750 peut provoquer des lésions du foie. Si vous remarquez au moins l'un des symptômes suivants : perte d'appétit, ictère (jaunissement de la peau), urines foncées, prurit, estomac sensible à la palpation, arrêtez de prendre Cipro-Denk 750 et consultez votre médecin immédiatement.
– Cipro-Denk 750 peut provoquer une réduction du nombre de globules blancs et votre résistance aux infections peut s'en trouver diminuée. Si vous souffrez d'une infection avec des symptômes tels que de la fièvre et une grave détérioration de votre état général, ou de la fièvre et des symptômes locaux (comme l'infection d'une plaie au niveau de la gorge/bouche ou des douleurs en urinant), vous devez consulter votre médecin immédiatement. Il est possible qu'une analyse de sang montre une diminution du nombre de globules blancs (agranulocytose). Il est important que votre médecin soit au courant de tous les médicaments que vous prenez.
– Dites à votre médecin si vous ou un membre de votre famille souffrez d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car votre médecin vous surveillera alors concernant le risque d'anémie induite par Cipro-Denk 750.
– Votre peau deviendra plus sensible à la lumière du soleil ou à la lumière ultraviolette lorsque vous prendrez Cipro-Denk 750. Pour cette raison, vous devez éviter de vous exposer à la lumière du soleil ou aux UV artificiels (sous un banc solaire, par ex.).
– Si votre vision s'altère ou si vos yeux semblent subir une quelconque atteinte, consultez immédiatement un ophtalmologiste.

Autres médicaments et Cipro-Denk 750
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé ou pourriez prendre/utiliser tout autre médicament.

Ne prenez pas Cipro-Denk 750
en même temps que la tizanidine car cela pourrait avoir des effets indésirables comme une hypotension artérielle et une somnolence (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais Cipro-Denk 750 »).

Les médicaments suivants sont connus pour interagir avec Cipro-Denk 750. Si vous les prenez en même temps que Cipro-Denk 750, leur effet thérapeutique peut s'en trouver altéré.

La probabilité de développer des effets indésirables peut également être augmentée.

Veuillez prévenir votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
– des antagonistes de la vitamine K (p.ex. warfarine) ou d'autres anticoagulants oraux (fluidifiants sanguins)
– du probénécide (pour traiter la goutte)
– du méthotrexate (pour certains types de cancer, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde)
– de la théophylline (pour les problèmes de respiration)
– de la tizanidine (pour détendre le système musculo-squelettique en cas de sclérose en plaques)
– de l'olanzapine (un médicament antipsychotique)
– de la clozapine (un anti-psychotique)
– du ropinirole (pour la maladie de Parkinson)
– de la phénytoïne (pour l'épilepsie)
– du métoclopramide (pour nausées et vomissements)
– de la cyclosporine (pour maladie de la peau, arthrite rhumatoïde et transplantation d'organe)
– du glibenclamide (pour diabète)
– d'autres médicaments pouvant modifier votre rythme cardiaque, c.-à-d. des médicaments qui appartiennent au groupe des antiarythmiques (par ex. quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, dofétilide, ibutilide), des antidépresseurs tricycliques, certains antibiotiques (appartenant au groupe des macrolides), certains antipsychotiques.

Cipro-Denk 750 peut augmenter la concentration des substances suivantes dans votre sang :
– de la pentoxifylline (pour les troubles de la circulation)
– de la caféine
– de la duloxétine (pour dépression, lésion nerveuse diabétique ou incontinence)
– de la lidocaïne (pour maladies cardiaques ou comme anesthésiant)
– du sildénafil (p.ex. pour dysfonctionnement érectile).

Certains médicaments diminuent l'effet de Cipro-Denk 750. Veuillez avertir votre médecin si vous prenez ou souhaitez prendre l'un des produits suivants :
– des antiacides (utilisés pour traiter l'acidité de l'estomac)
– de l'oméprazole
– des compléments minéraux
– du sucralfate
– un chélateur polymérique du phosphate (par ex. sévélamer)
– des médicaments ou des compléments alimentaires contenant du calcium, du magnésium, de l'aluminium ou du fer.

Si vous devez absolument prendre ces produits, prenez Cipro-Denk 750 environ deux heures avant ou au minimum quatre heures après.

Cipro-Denk 750 avec des aliments et boissons
Vous pouvez prendre Cipro-Denk 750 au cours d'un repas ou bien en dehors des repas. L'absorption de la substance active n'est que peu modifiée par le calcium contenu dans les aliments.

Cependant, ne prenez pas Cipro-Denk 750 avec des produits laitiers, tels que le lait ou les yaourts, ou avec des boissons enrichies en minéraux (par ex. jus d'orange enrichi en calcium).

Assurez-vous de boire suffisamment au cours du traitement avec Cipro-Denk 750.

Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.