

CARA ANTERIOR (TIRO)

175mm
150mm
Levantamiento

Dermofix crema

Sertaconazol 2%

Acción farmacológica

Sertaconazol es un nuevo antimicótico tópico dotado de una potente actividad fungicida, con un amplio espectro de actividad en el que se incluyen las levaduras patógenas (*Candida albicans*, *C. tropicallis*, *C. spp.*, *Pityrosporum orbiculare*), dermatofitos (*Trichophyton*, *Epidemophyton* y *Microsporum*) y otros agentes causantes y acompañantes de las infecciones de la piel y de las membranas mucosas como los gérmenes gram-positivos (*Staphylococcus* y *Enterococcus*).

Composición

Per g. de crema:

Sertaconazol nitrato..... 20 mg

Excipientes (permiso estearato de stienglicol y polietilenglicol, lauroil macrogliceridos, isosteárate de glicerol, aceite de vaselina, nipecin, ácido sálico, agua) c.s.

Indicaciones

Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel, como las dermatofitosis, *Tinea pedis* (pie de atleta), *Tinea cruris* (ezema de Hebra), *Tinea corporis* (herpes circinatus), *Tinea barbae* (micosis de la barba) y *Tinea manus*, *Candidiasis* (Moniliasis) y *Pityriasis versicolor* (*Pityrosporum orbiculare*, *Malassezia furfur* anteriormente).

Posología

Aplicar la crema una o dos veces al día (preferentemente por la noche o por la mañana y por la noche), suave y uniformemente sobre la lesión, procurando, además, abarcar 1 cm de piel sana (aproximadamente) alrededor de la zona afectada.

La duración del tratamiento para obtener la curación, varía de un paciente a otro, en función del agente etiológico y de la localización de la infección. En general, se recomienda cuatro semanas de tratamiento para asegurar una curación clínica y microbiológica completa y la no aparición de recaídas, aunque, en muchos casos, esta curación clínico-microbiológica aparece antes, entre dos y cuatro semanas de tratamiento.

Contraindicaciones

No administrar en caso de alergia conocida al producto o a uno de los constituyentes del excipiente.

Precauciones

DERMOFIX no debe utilizarse para tratamientos oftalmológicos.

Interacciones medicamentosas

No se han reportado interacciones.

Efectos indeseables

Su seguridad en tratamiento local es excelente; no se han observado efectos tóxicos o fotosensibles. Han habido informes aislados de reacción eritematosa local ligera y pasajera durante las primeras días de tratamiento; no ha sido necesaria la suspensión del tratamiento.

Uso durante el embarazo

Después de la aplicación típica de grandes cantidades, no se detectarán niveles plasmáticos; a pesar de ello, no se ha demostrado su inocuidad en mujeres embarazadas; por tanto debe evaluarse la relación riesgo-beneficio antes de su utilización durante el embarazo y en madres lactantes.

Sobredosificación y tratamiento

Considerando la concentración de sustancia activa y la vía de administración, es imposible la intoxicación; no obstante, en caso de ingestión accidental, debe aplicarse el tratamiento sintomático adecuado.

Presentación

Crema al 2%.

Envases conteniendo 20 g y 30 g.

Guardar a temperatura inferior a 30°C

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Dermofix cream

Sertaconazole 2%

Pharmacological action

Sertaconazole is a new topical antimycotic endowed with a potent fungicidal activity, with a broad activity spectrum where the pathogenic yeasts (*Candida albicans*, *C. tropicallis*, *C. spp.*, *Pityrosporum orbiculare*), dermatophytes (*Trichophyton*, *Epidemophyton* and *Microsporum*) and other causing and accompanying agents in skin and mucous membranes infections like the gram-positive germs (*Staphylococcus* and *Enterococcus*) are included.

Composition

Per g. of cream:

Sertaconazole nitrate..... 20 mg

Excipients (ethyleneglycol and polyethylene glycol palmito stearate, lauroyl macroglycerides, glyceryl isostearate, light paraffin oil, nipecin, sorbic acid, water) q.s.

Indications

Topical treatment of surface skin mycoses, such as dermatophytosis, *Tinea pedis* (athlete's foot), *Tinea cruris* (Hebra's eczema), *Tinea corporis* (herpes circinatus), *Tinea barbae* (beard mycosis) and *Tinea manus*, *Candidiasis* (Moniliasis) and *Pityriasis versicolor* (*Pityrosporum orbiculare*, *Malassezia furfur* formerly).

Dosage

Apply the cream one or two times every day (preferably at night or in the morning and at night), mildly and uniformly on the lesion, trying, besides, to embrace 1 cm of sound skin (approximately) around the affected area.

The duration of the treatment to obtain the healing, varies from one patient to another, in function of the etiologic agent and location of the infection. In general, four weeks of treatment are recommended to ensure a complete clinical and microbiological healing and the non appearance of relapses, though, in many cases, this clinical-microbiological healing appears earlier, between two and four weeks of treatment should be applied.

ferrer	Escala 1:1	Código Interno 5002361	Prospecto Dermofix crema 2% VT IFE (1/2)	Nº Perfil M0267.PR3
Oficina Técnica	Material Papel tipo fito o rotoloform blanco de 40 g/m ²	Dimensiones 280x175 mm	Plegado Sin plegar	Fecha 13/03/14
Aprobador	Referencia n° 5002361/11-1403	Anula a 5002361/10-1210	Motivo Añadir revisión data Jordana,	Prueba a
Fecha:	Tintas	■ Negro (100-50%)	■ Piel	Realización Ferrer/4



83

CARA POSTERIOR (RETIRO)

175mm
165mm
Largo=175mm

Contraindications

Do not administer it in case of known allergy to the product or to one of the constituents of the excipient.

Precautions

DERMOFIX should not be used for ophthalmological treatments.

Drug interactions

No interactions have been reported.

Undesirable effects

Its safety in local treatment is excellent; no toxic or photosensitizing effects have been observed. There have been isolated reports of slight local and transient erythematous reaction during the first treatment days; treatment discontinuance has not been required.

Use during pregnancy

After the topical application of big amounts, no plasma levels will be detected; in spite of this, its innocuousness in pregnant women has not been demonstrated; therefore the risk-benefit ratio should be evaluated before its use during pregnancy and in nursing mothers.

Overdosage and treatment

Considering the active substance concentration and the administration route, intoxication is impossible; however, in case of accidental ingestion, the appropriate symptomatic treatment should be applied.

How supplied

2% Cream.
Packages containing 20 g and 30 g.

Keep a temperature lower than 30°C.

Drugs should be kept out of the reach and sight of children.

Dermofix creme**Sertaconazole 2%****Action pharmacologique**

Le Sertaconazole est un nouvel antimycosique topique doté d'une puissante activité fungicide, avec un large spectre d'activité dans lequel on inclut les levures pathogènes (*Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. spp.*, *Phytoporum orbiculare*), les dermatophytes (*Trichophyton*, *Epidemophyton* et *Microsporum*) et d'autres agents causants et accompagnants des infections de la peau et des membranes muqueuses comme les germes gram-positifs (*Staphylococcus* et *Streptococcus*).

Composition

Par g. de crème:

Sertaconazole nitrate 20 mg

Excipients (palmito stéarate d'éthyleneglycol et polyéthylèneglycol, lauroyl macroglycérides, isostéarate de glycérol, paraffine liquide légère, nipagin, acide sorbique, eau) q.s.

Indications

Traitement topique des mycoses superficielles de la peau, comme les dermatophytoses, Tinea pedis (pied d'athlète), Tinea cruris (ectéma de Habora), Tinea corporis (herpès circinatus), Tinea barbae (myose de la barbe) et Tinea manus, Candidose (Moniliose) et Phlyctis versicolor (Phytoporum orbiculare), Malassezia furfur superavant.

Posologie

Appliquer la crème une ou deux fois par jour (de préférence le soir ou le matin et le soir), doucement et uniformément sur la lésion, en tâchant, en outre, de couvrir 1 cm de peau saine (aviron) autour de la zone affectée. La durée du traitement pour obtenir la guérison varie d'un patient à un autre, en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection. En général, on recommande quatre semaines de traitement pour assurer une guérison clinique et microbiologique complète et la non apparition de récidives, bien que, dans beaucoup de cas, cette guérison clinico-microbiologique apparaît avant, entre deux et quatre semaines de traitement.

Contre-indications

Ne pas administrer en cas d'allergie connue au produit ou à l'un des constituants de l'excipient.

Précautions

DERMOFIX ne doit pas être utilisé pour des traitements ophthalmologiques.

Interactions médicamenteuses

On n'a pas rapporté d'interactions.

Effets indésirables

Sa sécurité en traitement local est excellente; on n'a pas observé d'effets toxiques ou photosensibles. Il y a eu des rapports isolés de réaction erythématoise locale légère et passagère pendant les premiers jours de traitement; il n'a pas été nécessaire d'arrêter le traitement.

Utilisation pendant la grossesse

Après l'application topique de grandes quantités, on ne détectera pas de niveaux plasmatiques; malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez les femmes enceintes; par conséquent, on doit évaluer la relation risque-bénéfice avant son utilisation pendant la grossesse et chez les mères qui allaitent.

Surdosage et son traitement

En considérant la concentration de substance active et la voie d'administration, l'intoxication est impossible; cependant, en cas d'ingestion accidentelle, on doit appliquer le traitement symptomatique adéquat.

Présentation

Crème à 2%.

Emballages contenant 20 g et 30 g.

Gardez à une température inférieure à 30°C.

On doit garder les médicaments hors de la portée et de la vue des enfants.

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028 Barcelona (España)

5002361/11-1403
10/2007

	Escala 1:1	Código Interno 5002361	Prospecto Dermofix crema 2% VT IFE (2/2)	Nº Perfil M0267.PR3
Oficina Técnica	Materiasl Papel tipo lito o rotomold blanco de 40 g/m ²	Dimensiones 280x175 mm	Plegado Sin plegar	Fecha 13/03/14
Aprobado:	Referencia nº 5002361/11-1403	Anade a 5002361/10-1210	Motivo Añadir revisión date Jordania.	Prueba a
	Tintas	■ Negro (100-50%)		Realización Ferrer/4
Fecha:	■ Perfil			83

