

175

		<p>Somazina® 100 mg/ml solución oral Citicoline</p> <p>Composición Cada ml contiene: Citicoline (D.C.I.), 100 mg; Excipientes: c.s.</p> <p>Propiedades Citicoline estimula la biosíntesis de los fosfolípidos estructurales de la membrana neuronal. Citicoline mediante esta acción, mejora la función de los mecanismos de membrana, tales como el funcionamiento de las bombas de intercambio iónico y los receptores insertados en ella, cuya modulación es imprescindible en la neurotransmisión.</p> <p>Gracias a su acción estabilizadora de las membranas, citicoline posee propiedades antiédematosas cerebrales.</p> <p>Ensayos clínicos han demostrado que Citicoline mejora los síntomas asociados a estados de disfunción cerebral secundarios a diversos procesos, tales como el traumatismo craneoencefálico y el accidente vascular cerebral agudo. Citicoline mejora el nivel de atención y de conciencia, así como actúa favorablemente sobre la amnesia y los trastornos cognitivos, sensitivos y motores asociados a estas patologías.</p> <p>Indicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ictus en fase aguda y sus secuelas neurológicas. • Traumatismos craneales recientes y sus secuelas neurológicas. • Trastornos cognitivos y del comportamiento secundarios a patologías cerebrales vasculares y degenerativas crónicas. <p>Dosificación</p> <p>Adultos: La dosis normal es de 500 a 2000 mg/día, dependiendo de la gravedad del cuadro a tratar. Puede tomarse directamente o disuelta en medio vaso de agua (120 ml), con las comidas o fuera de ellas.</p> <p>Ancianos: Somazina no requiere ningún ajuste de dosificación específico para este grupo de edad.</p> <p>Niños: Somazina no ha sido adecuadamente estudiada en niños, por lo que sólo debería administrarse si su médico lo considera necesario.</p> <p>Contraindicaciones No debe administrarse a pacientes con hipertonia del parasimpático o en caso de alergia conocida al fármaco.</p> <p>Efectos secundarios Los efectos adversos de este medicamento son muy raros (menos de 1 de cada 10,000 pacientes). Puede aparecer dolor de cabeza, vértigo, náuseas, diarrea ocasional, enrojecimiento de la cara, hinchazón de las extremidades y cambios de la presión arterial. Si presenta alguno de estos u otros síntomas, avise a su médico.</p> <p>Incompatibilidades e interacciones No debe administrarse junto a medicamentos que contengan meclufenoxato.</p> <p>Somazina® 100 mg/ml solution buvable Citicoline</p> <p>Composition Chaque ml contient: Citicoline (D.C.I.), 100 mg; Excipients, q.s.</p> <p>Propriétés La Citicoline stimule la biosynthèse des phospholipides structuraux de la membrane neuronale. Grâce à cette action la citicoline améliore la fonction des mécanismes de membrane, tels que le fonctionnement des pompes à échange ionique et des récepteurs qui y sont insérés, dont la modulation est indispensable dans la neurotransmission. Grâce à son action stabilisatrice des membranes, la citicoline possède des propriétés anti-oedémateuses cérébrales.</p> <p>Des essais cliniques ont démontré que la Citicoline améliore les symptômes associés à des états de dysfonctionnement cérébral secondaires à divers processus, comme le traumatisme craneo-encéphalique et l'accident vasculaire cérébral aigu. La Citicoline améliore le niveau d'attention et de conscience, et agit favorablement sur l'amnésie et les troubles cognitifs, sensitifs et moteurs associés à ces pathologies.</p> <p>Indications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accident vasculaire cérébral en phase aigüe et leurs séquelles neurologiques. • Traumatismes crâniens récents et leurs séquelles. • Troubles cognitifs et du comportement secondaires à des pathologies vasculaires cérébrales et dégénératives chroniques. <p>Dosage et mode d'administration</p> <p>Adultes: La dose normale est de 500 – 2000 mg par jour, selon la gravité du cadre à traiter. Il peut être prise directement ou dissoute dans un demi verre d'eau (120 ml) pendant ou en dehors des repas.</p> <p>Personnes âgées: Somazina ne requiert aucun ajustement de la dose spécifique pour ce groupe d'âge.</p> <p>Enfants: Somazina n'a pas été convenablement étudiée chez les enfants et doit donc être administré seulement si votre médecin le juge nécessaire.</p> <p>Contre-indications La citicoline ne doit pas être administrée chez les patients souffrant d'hyper-tonie du système parasympathique. En cas d'allergie connue à la substance.</p> <p>Effets secondaires Les effets indésirables de ce médicament sont très rares (moins de 1 patient sur 10,000). Il peut apparaître des maux de tête, vertiges, nausées, diarrhée occasionnelle, rougeur du visage, gonflement des extrémités et changements de la pression artérielle. Si vous présentez quelques-uns de ces symptômes ou d'autres, informez à votre médecin.</p> <p>Incompatibilités et interactions Ne doit pas être administrée simultanément avec des médicaments contenant du méclufenoxate.</p>		
--	--	---	--	--

297

175

		<p>Somazina® 100 mg/ml oral solution Citicoline</p> <p>Composition Each ml contains: Citicoline (I.N.N.), 100 mg; Excipients, q.s.</p> <p>Properties Citicoline stimulates the biosynthesis of structural phospholipids of neuronal membrane. Citicoline, by means of this action improves the function of membrane mechanisms, such as the functioning of the ionic exchange pumps and receptors inserted there, the modulation of which is indispensable in neurotransmission. Thanks to its membranes-stabilizing action, citicoline has cerebral antiedematous properties.</p> <p>Clinical trials have demonstrated that Citicoline improves the symptoms associated with cerebral dysfunction conditions consequent to various processes, such as head trauma and acute cerebrovascular accident. Citicoline improves the level of attention and consciousness, and also acts favourably on amnesia and cognitive, sensitive and motor disorders associated with these pathologies.</p> <p>Indications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stroke, Acute phase and its neurological sequelae. • Traumatic Brain injury and its neurological sequelae. • Cognitive and behavioural impairment secondary to chronic vascular and degenerative cerebral disorders. <p>Dosage</p> <p>Adults: The usual dosage is from 500 to 2,000 mg daily, depending on the severity of the symptoms to be treated.</p> <p>Somazina can be administered directly or dissolved in half a glass of water (120 ml), with the meals or between them.</p> <p>Elderly: Somazina does not need any specific dose adjustment for this age group.</p> <p>Children: Somazina has not been adequately controlled in children, therefore, it should only be administered when your doctor considers it necessary.</p> <p>Contraindications Must not be administered to patients with hypertonia of the parasympathetic or in case of known allergy to the drug.</p> <p>Side-effects The side effects of this medicinal product are very rare (less than 1/10,000 patients). It may produce headache, vertigo, nausea, occasional diarrhea, reddening of the face, edema of extremities and changes in arterial pressure. If you notice any side effect, please tell your doctor.</p> <p>Incompatibilities Must not be administered along with medications containing meclufenoxate.</p> <p>Somazina reinforces the effects of L-Dopa.</p> <p>Normes pour la correcte administration de la préparation On administre le produit à l'aide d'une seringue doseuse, d'après le schéma suivant:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Introduire la seringue doseuse avec le piston d'injection faisant pression jusqu'au fond. 2 - Aspirer le dosage indiqué en faisant tourner le piston d'injection, en tenant en compte que le liquide contenu dans la seringue coincide exactement avec le niveau prescrit. 3 - Administrez la préparation en la mélangeant avec un peu d'eau. <p>Après chaque administration on recommande de laver la seringue doseuse avec de l'eau.</p> <p>Sous ordonnance médicale. Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.</p> <p>Fabriqué par: Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028 - BARCELONA (Espagne)</p>		
--	--	---	--	--

297

ferrer	Escala 1:1	Código interno 5000606	Prospecto Somazina solución 30 ml gotas IFE (1/2)	Nº Perfil P297x175SP
Oficina Técnica	Material Papel tipo lito o rotoform blanco de 50 g/m ²	Dimensiones 297x175 mm	Plegado Sin plegar	Fecha 17/11/10
Aprobado:	Referencia nº 5000606/5-1011	Anula a 5000606/4-0807	Motivo Actualización texto	Prueba C
Tintas	■ Negro (100-50-30-15%)			Realización Ferrer
Fecha:	Perfil			

ferrer	Escala 1:1	Código interno 5000606	Prospecto Somazina solución 30 ml gotas IFE (2/2)	Nº Perfil P297x175SP
Oficina Técnica	Material Papel tipo lito o rotoform blanco de 50 g/m ²	Dimensiones 297x175 mm	Plegado Sin plegar	Fecha 17/11/10
Aprobado:	Referencia nº 5000606/5-1011	Anula a 5000606/4-0807	Motivo Actualización texto	Prueba C
Tintas	■ Negro (100-50-30-15%)			Realización Ferrer
Fecha:	Perfil			