

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

1000000115424



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé
3. COMMENT PRENDRE ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
5. COMMENT CONSERVER ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTERIENS de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de deuxième génération.

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 6 ans.

Il est indiqué chez l'adulte :

- dans le traitement des otites aiguës, des sinusites et de certaines angines ;
- dans le traitement des infections respiratoires : bronchites aiguës et chroniques, pneumopathies bactériennes (présence de germes au niveau des poumons).

Il est indiqué chez l'enfant à partir de 6 ans :

- dans le traitement des otites aiguës et de certaines angines,
- dans le traitement des infections respiratoires.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé si :

- vous avez une allergie au céfuroxime ou aux antibiotiques de la même famille (céphalosporines).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé :

Mises en garde spéciales

- Toute manifestation allergique (éruptions cutanées, démangeaisons...) en cours de traitement doit être signalée **immédiatement** à votre médecin.
En cas d'apparition des symptômes suivants : respiration sifflante, oppression de la poitrine, gonflement des paupières, du visage ou des lèvres, prenez **immédiatement contact avec votre médecin**, il pourra envisager d'interrompre le traitement.
- Avant de prendre ce traitement, prévenir votre médecin si à l'occasion d'un traitement antibiotique antérieur vous avez présenté une réaction allergique : une urticaire ou autres éruptions cutanées, démangeaisons, oedème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique).
- La survenue de diarrhée au cours d'un traitement antibiotique ne doit pas être traitée sans avis médical.
- La prise de comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car elle peut entraîner une fausse route.
- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des réactions allergiques.

Précautions d'emploi

PREVEZ VOTRE MEDECIN :

- si vous souffrez de maladie du rein afin que le traitement soit adapté,
- si vous prenez déjà un antibiotique ou un diurétique.

Ce médicament contient 5,2 mg de sodium par comprimé de 250 mg. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

De plus, ce médicament peut occasionner une fausse réaction positive de certains examens de laboratoire, notamment de la glycosurie (taux de sucre dans les urines).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse, que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament. Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruption sur la peau, candidose (*affection due à certains champignons microscopiques*), avertissez immédiatement votre médecin qui vous conseillera sur la conduite à tenir car ces effets sur votre enfant sont peut être dus à ce médicament. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament si vous allaitez.

Informations importantes concernant certains composants de ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé

Parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), sodium (5,2 mg par comprimé de 250 mg).

3. COMMENT PRENDRE ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé ?**Posologie**

A titre indicatif, la posologie usuelle est :

Chez l'adulte :

- Otites, sinusites, angines: 250 mg (1 comprimé) 2 fois par jour matin et soir.
- Bronchites aiguës et chroniques : 250 mg (1 comprimé) 2 fois par jour matin et soir.
- Pneumopathies : 500 mg (2 comprimés de 250mg) 2 fois par jour matin et soir.

Chez l'enfant à partir de 6 ans :**Dans tous les cas, ne pas dépasser la posologie adulte :**

- Soit en cas d'angines, d'otites, d'infections respiratoires basses autres qu'une pneumopathie bactérienne : **500 mg/jour** en 2 prises, qui est atteinte pour un enfant à partir de 17 kg.
- Soit en cas de pneumopathie bactérienne : **1000 mg/jour** en 2 prises, qui est atteinte pour un enfant à partir de 34 kg.

Infections de la sphère ORL, infections respiratoires basses autre qu'une pneumopathie bactérienne :

- **Enfants à partir de 6 ans avec un poids inférieur à 17 kg**
 - Angines : 30 mg/kg/jour en 2 prises.
La durée de traitement de certaines angines est de 4 jours.
 - Otites : 30 mg/kg/jour en 2 prises.
- Infections respiratoires basses autres qu'une pneumopathie bactérienne : 30 mg/kg/jour en 2 prises.
- **Enfants à partir de 6 ans avec un poids supérieur ou égal à 17 kg**
 - Angines : 250 mg (1 comprimé) 2 fois par jour, matin et soir.
La durée de traitement de certaines angines est de 4 jours.
 - Otites : 250 mg (1 comprimé) 2 fois par jour matin et soir.
 - Infections respiratoires basses autres qu'une pneumopathie bactérienne : 250 mg (1 comprimé) 2 fois par jour, matin et soir.

Pneumopathies bactériennes :

- **Enfants à partir de 6 ans avec un poids inférieur à 34 kg :**
30 mg/kg/jour en 2 prises.
- **Enfants à partir de 6 ans avec un poids supérieur ou égal à 34 kg :**
500 mg 2 fois par jour, soit 4 comprimés de 125 mg matin et soir ou 2 comprimés de 250 mg matin et soir.

La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

Mode d'administration

Voie orale.

Avalez les comprimés sans les croquer, avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Il est recommandé de prendre ce médicament en 2 prises espacées de 12 heures, de préférence 15 à 30 minutes après les repas du matin et du soir.

Durée de traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.

L'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique, mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Cas particulier : la durée du traitement de certaines angines est de 4 jours.

Si vous avez pris plus de ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin.

Si vous oubliez de prendre ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé :

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en apercevez. Puis poursuivez le traitement selon l'ordonnance du médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ces effets indésirables sont classés du plus fréquemment au plus rarement observé.

Effets indésirables fréquemment observés

• Troubles gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, douleurs abdominales). Ne prenez jamais de traitement antidiarrhéique sans prescription médicale.

- Maux de tête.
- Augmentation de certains globules blancs (éosinophiles) dans le sang.
- élévation de certaines enzymes du foie (transaminases), et de la lactate déshydrogénase.
- Prolifération de certains champignons microscopiques (*Candida*).

Effets indésirables peu fréquemment observés

- Sensations vertigineuses.
- Eruption cutanée.
- Vomissements.
- Diminution de certains globules blancs (neutrophiles et leucocytes) dans le sang exposant à une sensibilité accrue aux infections.
- Diminution du nombre des plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine).

Effets indésirables rarement observés

- Urticaire (éruption cutanée identique à celle provoquée par une piqûre d'ortie) et démangeaisons.
- Colite pseudo-membraneuse (inflammation de l'intestin avec diarrhée sévère et douleurs au ventre).

Effets indésirables très rarement observés

- Anémie (diminution des globules rouges dans le sang).
- Fièvre, maladie sérique (caractérisée par une fièvre élevée associée à des manifestations articulaires, des manifestations cutanées et une atteinte rénale).
- Erythème polymorphe (atteinte cutanée sévère avec éruption de papules rouges).
- Réactions allergiques sévères, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell (d décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps).
- Atteinte du foie (jaunisse et hépatite).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**Que contient ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé ?****La substance active est :**

Céfuroxime axétil 300,72 mg
Quantité correspondant en céfuroxime 250,00 mg

Pour un comprimé pelliculé de 250 mg.

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline (Avicel PH 102), croscarmellose sodique type A, laurilsulfate de sodium, silice colloïdale anhydre, huile végétale hydrogénée.

Pelliculage : hypromellose, propylène glycol, Opaspray® blanc [hypromellose 5cP ou 6cP, dioxyde de titane (E171), benzoate de sodium, alcool dénaturé, eau purifiée] (résidu sec), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216).

Qu'est-ce que ZINNAT 250mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 8.

Exploitant :

GlaxoSmithKline Export Limited

980 Great West Road
Brentford, TW8 9GS
Royaume Uni

Fabricant

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road
Barnard Castle
County Durham - DL12 8DT
Royaume-Uni

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est juillet 2009.**CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE****QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES**

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- 1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2- Respectez strictement votre ordonnance.
- 3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.



GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline
Artwork Information
Panel

RSC A/W
Version:
2

Item Number:

1000000115424

Manufacturing Site:

GSK-GBR-Barnard Castle-UKBAR

Market or Pack Owner:

Cote D'ivoire-CIV

Market Trade Name:

Zinnat

No. of Colours: 3

(does NOT include Varnish, if applicable)

List Colours:

(include sample in fields provided below;
e.g. spot / spot-CMYK equivalent)

354	Y	K	

Technical Reference No(s.):

JMF231

(do NOT include the technical reference doc(s) version no(s).)

Artwork copyright is the property of the
GlaxoSmithKline Group of Companies

All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork.

The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers.

The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.

ATTENTION • ATTENTION

To Ensure Accurate PDF Viewing and Printing:

FOR SCREEN VIEWING: Use Adobe Acrobat 5 Professional or Adobe Acrobat Reader, Standard or Professional (higher than 5). **Overprint Preview** must be activated for accurate on screen viewing.

FOR PRINTING: Use only Acrobat Professional version 5 or higher. **"Apply Overprint Preview"** or **"Simulate Overprinting"** must be activated in the print settings for printing accurate hard copies.

180 mm Measuring Bar
If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

IMPORTANT

GSK Market is responsible for this product, its design and content.

Ensure the artwork is thoroughly checked, all the text proof-read and approved.

RSC GSK is responsible for site technical requirements and pre-press suitability.

GSK Market is responsible to advise RSC in case changes required impact the followings:

Formulation

Tablet embossing

Storage conditions

Shelf Life

Front of Leaflet

Page 1 of 2

LEAFLET: USER INFORMATION

**Read this leaflet carefully before taking this medicine.**

- Keep this leaflet; there might be a need to read it again.
- If you have any inquiries or doubts, ask your doctor or pharmacist.
- This drug has been personally prescribed to you. Do not advise it to anybody else, even if his case presents the same symptoms. You may harm him.
- If any of adverse reactions becomes serious, or if you experience an adverse event, whether or not it is included in this leaflet, please advise your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. WHAT IS ZINNAT 250 mg, film-coated tablet AND WHAT IT IS USE FOR
2. WHICH INFORMATION YOU MUST HAVE BEFORE TAKING ZINNAT 250 mg, film-coated tablet
3. HOW TO TAKE ZINNAT 250 mg, film-coated tablet
4. WHAT ARE THE POTENTIAL SIDE EFFECTS
5. HOW TO STORE ZINNAT 250 mg, film-coated tablet
6. ADDITIONAL INFORMATION.

1. WHAT IS ZINNAT 250 mg, film-coated tablet AND WHAT IT IS USE FOR

Second generation BACTERICIDAL cephalosporin ANTIBIOTICS of the beta-lactam group.

This medicine is indicated for adults and children from 6 years.

It is indicated in adult:

- For the treatment of acute otitis, sinusitis and in some tonsillitis;
- For the treatment of respiratory tract infections: acute and chronic bronchitis, bacterial pneumonitis (presence of germs in the lungs).

It is indicated in children from 6 years:

- For the treatment of acute otitis, sinusitis and in some tonsillitis;
- For the treatment of respiratory tract infections.

2. WHICH INFORMATION YOU MUST HAVE BEFORE TAKING ZINNAT 250 mg, film-coated tablet

This medicine SHOULD NOT BE USED in the following cases:

- Hypersensitivity to cefuroxime or to other antibiotics belonging to the same family (cephalosporin).

IF YOU ARE NOT SURE, PLEASE SYSTEMATICALLY ASK YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST.

Be careful with ZINNAT 250 mg, film-coated tablet:

Special warnings

- Any allergic manifestation (skin eruption, itching...) during treatment must be reported to a doctor **immediately**. If the following symptoms appear: wheezing, breathing, eyelid, face or lips swelling, **contact immediately your doctor** because he might advise to interrupt your treatment.
- Before taking this medicine, prevent your doctor if while taking an antibiotic medicine you got allergic reaction such as rashes, other skin reactions, itching, Quincke oedema (sudden swelling of the face or the neck).
- Patient can develop serious diarrhoea during or after antibiotic use. This diarrhoea should not be treated without doctor advice.
- Taking tablets is contraindicated for children less than 6 years because it can be on the wrong track.
- This medicine contains methyl parahydroxybenzoate (E218) and propyle parahydroxybenzoate (E216) and can provoke allergic reactions.

Precautions

PLEASE, ADVICE YOUR DOCTOR:

- If you have renal impairment. Dosage must be reviewed,
- If you receive concurrent treatment such as antibiotics or diuretics.

Patient under strict sodium restrictive diet must be informed that this medicine contains 5.2 mg of sodium per 250 mg tablet.

This medicine can make some medical test being positive such as glycosuria (sugar urine test).

IF YOU HAVE A DOUBT, DO NOT HESITATE TO CONTACT YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST.

Taking with other medicines

If you take or took recently another medicine, including medicine obtained over the counter, speak about it to your doctor or to your pharmacist.

Pregnancy and Breast-feeding

Please advice your doctor if you are pregnant. He will see the opportunity to use this medicine. If during the treatment you notice that you are pregnant, ask the doctor.

Breast-feeding is possible while taking this medicine. If the baby suffers problems such as diarrhoea, skin rash, candidiasis (*infection caused by certain microscopic fungi*), inform your doctor immediately because these effects on your baby might be caused by this medicine.

You should always consult your doctor or pharmacist before taking any medicines if you are breast-feeding.

Important information concerning ZINNAT 250 mg, film-coated tablet 's components

Methyl parahydroxybenzoate (E218), propyle parahydroxybenzoate (E216),

sodium (5.2 mg per 250 mg tablet).

3. HOW TO USE ZINNAT 250 mg, film-coated tablet**Dosage**

As a guideline, the indicative doses may be:

In adults:

- Otitis, sinusitis, tonsillitis: 250 mg (1 tablet) twice daily, morning and evening.
- Acute and chronic bronchitis: 250 mg (1 tablet) twice daily, morning and evening.
- Pneumonitis: 500 mg twice daily, (2 tablets of 250 mg) twice daily, morning and evening.

Children from 6 years:

In all cases, **do not exceed the adult dosage:**

- Either in case of tonsillitis, otitis, and lower respiratory tract infection except bacterial pneumonia: **500 mg/day**, twice daily, reached for children from 17kg.
- Or in case of bacterial pneumonia: **1000 mg/day**, twice daily, reached for children from 34 kg.

(ORL)Respiratory tract infections, lower respiratory infections except bacterial pneumonia:

- **Children from 6 years of age and over weighing less than 17 kg:**
 - Tonsillitis: 30mg/kg/day, twice daily.
 - The duration of the treatment in some tonsillitis is 4 days.
 - Otitis: 30mg/kg/day, twice daily.
 - Lower respiratory tract infection except bacterial pneumonia: 30mg/kg/day, twice daily.
- **Children from 6 years of age weighing 17 kg or more:**
 - Tonsillitis: 250mg (1 tablet) twice daily, morning and evening
 - The duration of the treatment in some tonsillitis is 4 days.
 - Otitis: 250mg (1 tablet) twice daily, morning and evening.
 - Lower respiratory tract infection except bacterial pneumonia: 250mg (1 tablet) twice daily, morning and evening.

In case of bacterial pneumonias:

- **Children weighing less than 34 kg:** 30 mg/kg/day, twice daily.
- **Children weighing 34 kg or more:** 500 mg (2 tablets) twice daily morning and evening.

This dosage must be reduced in case of renal impairment.

Administration and use

Oral route.

Swallow the whole tablet with a glass of water.

When should this medicine be taken

This medicine should be taken twice daily, 12 hours interval, preferably 15 to 30 minutes after morning and evening's meals.

How long should this medicine be taken

In order to be effective, this antibiotic should be used regularly at the doses prescribed and the duration of treatment is as advised by your doctor.

Abatement of fever or any other symptoms does not mean that you are completely cured.

Any feeling of tiredness is not due to the antibiotic treatment but to the actual infection. Reducing or stopping the treatment would have no effect on this tiredness and would delay your recovery.

Particular case: duration of the treatment of some tonsillitis is 4 days.

If you take too much ZINNAT 250 mg, film-coated tablet:

Tell your doctor as soon as possible.

If you miss a dose of ZINNAT 250 mg, film-coated tablet:

If you miss a dose, take it as soon as you see it. And then continue the treatment as prescribed by the doctor.

4. WHAT ARE POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like other medicines, ZINNAT 250 mg, film-coated tablet can bring about undesirable effects, although everyone is not concerned.

These undesirable effects are classified from very common to very rarely observed.

Common undesirable effects observed:

- Gastro-intestinal disturbance (diarrhoeas, nausea and abdominal pain). Never take an anti-diarrhoea medicine without prescription.
- Headache.
- Rise of certain white blood cells (eosinophilia).
- Rise in serum liver enzymes (transaminases) and lactase dehydrogenate.
- Proliferation of some microscopic fungi (*Candida*).

Uncommon undesirable effects observed

- Dizziness.
- Skin eruption.
- Vomiting.
- Decrease in white blood cells (neutropenia and leukopenia) exposing to a sensibility increased in infections.
- Decrease in platelets (cells allowing the blood to coagulate).

Undesirable effects rarely observed

- Rash (skin eruption identical to that provoked by a stinging nettle), itches.
- Pseudomembranous colitis (intestine inflammation with diarrhoea and/or abdominal pains).

Undesirable effects very rarely observed

- Anaemia (red blood cells decrease).
- Fever, serum disease resulting in high fever associated to skin eruption, articular manifestations and renal troubles.
- Erythema multiform (severe skin reactions with red blotch).
- Severe allergic reactions, Stevens-Johnson syndrome, Lyell syndrome (unsticking of the skin which can quickly extend in a very grave way to all the body).
- Liver inflammation (hepatitis, jaundice).

In case occurrences of other undesirable effects not listed in this leaflet or if some undesirable effects worsen please inform your doctor or your pharmacist.

5. HOW TO STORE ZINNAT 250 mg, film-coated tablet?

Keep out of the reach and sight of children.

Do not use ZINNAT 250 mg, film-coated tablet after the expiry date printed on the outer of the package.

This product must be stored at a temperature not exceeding +30°C.

Medicines must not be thrown to mains drainage or to household refuse. Ask your pharmacist what to do with unused medicines. These measures will permit protection of the environment.

6. ADDITIONAL INFORMATION

What do ZINNAT 250 mg, film-coated tablet contains

The active substance is:

Cefuroxime 250.00 mg

In a form of cefuroxime axetil 300.72 mg

For one film-coated tablet of 250 mg.

Other ingredients are:

Microcrystalline cellulose (Avicel PH 102), type A croscarmellose sodium, sodium lauryl sulphate, colloidal silicon dioxide, hydrogenated vegetable oil.

Coating: hypromellose, propylene glycol, Opaspray® white [hypromellose 5cP or 6cP, titanium dioxide (E171), sodium benzoate, distorted alcohol, purified water] (dry residue)], methyl parahydroxybenzoate (E218), propyle parahydroxybenzoate (E216).

What is ZINNAT 250 mg, film-coated tablet and content of the outer package

This medicine appears in the form of film-coated tablet. Pack of 8.

Marketing authorization operator**GlaxoSmithKline Export Limited**

980 Great West Road

Brentford, TW8 9GS

United Kingdom

Manufacturer**Glaxo Wellcome Operations**

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham - DL12 8DT

United - Kingdom

The latest date of this leaflet update is July 2009.

ADVICES/ EDUCATION**WHAT ARE ANTIBIOTICS**

Antibiotics are efficient on bacterial infections but not efficient on viral infections. Your doctor chose this antibiotic because it is adapted to your case and efficient on your disease.

So, your doctor chose to prescribe you this antibiotic because it is exactly advisable in your case and in your current disease. Bacteria are able to survey and cross unless antibiotic action. This is what we call resistance: so that some antibiotic treatments are not efficient. This resistance is increased by incorrect use of antibiotics.

Resistant bacteria appearance can delay your recovery or make the medicine be not efficient when the following conditions are not respected:

- Take the right dose of medicine
- The medicine must be taken regularly
- The medicine must be taken as prescribed by doctor.

Consequently, if you want your medicine to be efficient:

1. **Only use antibiotic when it is prescribed by a doctor**
2. **Strictly respect your prescription**
3. **Don't take back an antibiotic without a doctor prescription, even if you think that you fight the same illness.**
4. **Never give your antibiotic to another person, it isn't adapted to its illness**
5. **While the treatment ends, return it to your pharmacist. He knows how to destroy it.**

GlaxoSmithKline

1000000115424

GlaxoSmithKline
Artwork Information
Panel

RSC A/W
Version:
2

Item Number:
1000000115424

Manufacturing Site:
GSK-GBR-Barnard Castle-UKBAR

Market or Pack Owner:
Cote D'Ivoire-CIV

Market Trade Name:
Zinnat

No. of Colours: 3
(does NOT include Varnish, if applicable)

List Colours:
(include sample in fields provided below;
e.g. spot / spot-CMYK equivalent)

354	Y	K	
-----	---	---	--

Technical Reference No(s).:
JMF231
(do NOT include the technical reference doc(s) version no(s).)

Artwork copyright is the property of the
GlaxoSmithKline Group of Companies

All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork.

The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers.

The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.

ATTENTION • ATTENTION

To Ensure Accurate PDF Viewing and Printing:
FOR SCREEN VIEWING: Use Adobe Acrobat 5 Professional or Adobe Acrobat Reader, Standard or Professional (higher than 5). **Overprint Preview** must be activated for accurate on screen viewing.

FOR PRINTING: Use only Acrobat Professional version 5 or higher. **"Apply Overprint Preview"** or **"Simulate Overprinting"** must be activated in the print settings for printing accurate hard copies.

180 mm Measuring Bar
If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

IMPORTANT

GSK Market is responsible for this product, its design and content.

Ensure the artwork is thoroughly checked, all the text proof-read and approved.

RSC GSK is responsible for site technical requirements and pre-press suitability.

GSK Market is responsible to advise RSC in case changes required impact the followings:

Formulation
Tablet embossing
Storage conditions
Shelf Life

Back of Leaflet
Page 2 of 2

Pharma code Ref. No. 7534