



Date : 27/05/2019	LRJ Pheniramine Maleate / Tetrazoline Hydrochloride Box of 01 vial	Code : /Ang/RWA Version : V00
-------------------	--	----------------------------------

1.6.3 Patient information leaflet (PIL)

LRJ®

Pheniramine - Tetrahydrozoline

FORM AND PRESENTATION :

10 ml bottle with a dropper.

COMPOSITION :

Pheniramine maleate	30 mg
Tetrahydrozoline chloride	5 mg
Thiomersal	1 mg
Excipients. q.s.f	
Water For Injection. q.s.f	10 ml

PHARMACEUTICAL PROPERTIES :

- Decongestant of ocular mucous and vasoconstrictor.
- LR J is an association of vasoconstrictor product (Tetrahydrozoline) having an alpha-stimulated activity , and antihistamine product (Pheniramine) that blocks the H1-Receptors.

THERAPEUTIC INDICATIONS :

- Irritation and congestion of the conjunctiva.
- Conjunctivitis of toxic and allergic origin with chronic and subacute evolution .

CONTRA-INDICATIONS :

- Glaucoma with closing of angle.
- Hypersensitivity to one of components of LRJ.

PRECAUTIONS FOR USE :

- It's extremely inadvisable to use LRJ for children less than 3 years.
- Avoid repeated instillations and/or prolonged time with patients attacked by arteriel hypertension , cardio-vasculair disease , hyperthyroidism arythmia and with diabetics.
- Avoid association with IMAO.

PREGNANCY AND NURSING :

There is no contra - indications.

UNDESIRABLE EFFECTS :

- Possibility of increase intraocular pressure.
- Collateral systemic effect not observed at habitual dose.

MODE OF ADMINISTRATION :

- Average : 2 instillations, 4 times a day during 7 to 10 days.

DURATION OF USE :

15 days after the opening of bottle.

STORAGE :

- Close the bottle after use.
- Keep away from light and heat.

PRESENTATION :

Box of 1 bottle of 10 ml.

M.A. : 923 319 1

This is a drug

- A drug is a specific product agent .
- A drug is a product acting on your health and its use, contrary to prescriptions may be dangerous for you.
- Strictly respect the doctor's prescription and the instructions of use he has prescribed.
- Follow your pharmacist's know this drug ; its indications and contra-indications.
- Do not discontinue the drug intake by yourself during the prescription period.
- Do not repeat the prescription or increase the dosage without consulting your doctor.

KEEP ANY DRUG OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Phéniramine - Tétryzoline

FORME PHARMACEUTIQUE :

Flacon compte-gouttes de 10 ml.

COMPOSITION :

Phéniramine maléate	30 mg
Tétryzoline chlorhydrate	5 mg
Thiomersal	1 mg
Excipients. qsp.	
Eau pour préparation injectable q.s.p	10 ml

PROPRIETES PHARMACEUTIQUE :

- Décongestionnant des muqueuses oculaires et vasoconstricteur.
- LRJ est une association d'un produit vasoconstricteur (Tétryzoline) ayant une activité alpha stimulante et d'un produit ayant une activité anti-histaminique (phéniramine) qui bloque les récepteurs H1.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Irritations et congestions de la conjonctive, conjonctivite d'origine toxique et allergique à évolution subaigue et chronique.

CONTRE-INDICATIONS :

- Glaucome par fermeture de l'angle.
- Hypersensibilité à l'un des composants du produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il est déconseillé de l'utiliser chez les enfants de moins de trois ans.
- Eviter les instillations répétées et/ou de façon prolongée chez les sujets atteints d'hypertension artérielle, de maladie cardio-vasculaire, d'hyperthyroïdie, d'arythmie et chez les diabétiques.
- Eviter l'association avec les IMAO.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Pas de contre indications.

EFFETS INDESIRABLES :

- Possibilité de mydriase gênante, d'augmentation de la pression intraoculaire.
- Effet systémique collatéral non constaté à dose habituelle.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

- En moyenne : 2 instillations, 4 fois par jour durant 7 à 10 jours.

DUREE D'UTILISATION :

15 jours après ouverture du flacon.

CONSERVATION :

- Reboucher le flacon après usage.

- A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

PRESENTATION :

Boîte de 1 flacon de 10 ml . A.M.M : 923 319 1

Ceci est un médicament.

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivez strictement la prescription du médecin, la méthode d'utilisation et les instructions du pharmacien qui vous a dispensé le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont experts en médicaments, ses bienfaits et ses risques.
- N'interrompez pas de vous-même la période du traitement qui vous a été prescrit.
- Ne répétez pas la même prescription sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر ي يؤثر على صحتك واسهلاكه خلاف التلبيبات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها
- تقييد بتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدواء وينفعه وضرره
- لا تقطع هذه العلاج المحددة لك من تناول نفسك.
- لا تدع ولا تزد علبه بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.