

175mm

14
12

10

Núcleo C.M.P. Forte

Actividad
Núcleo CMP Forte aporta los grupos fosfato necesarios en la unión de los monosacáridos con las ceramidas, para formar cerebrosidos y ácidos fosfatídicos que constituyen esfingomielina y glicerofosfolípidos, componentes principales de la vaina de mielina, con lo que se consigue unas mayores propiedades tróficas para la maduración y regeneración axonal del tejido nervioso.

Composición

	Por cápsula	Por ampolla liofilizada
Citidín-5'-monofosfato disódico (CMP sal disódica)	5 mg	10 mg
Uridín-5'-trifosfato trisódico (UTP sal trisódica)		
Uridín-5'-difosfato disódico (UDP sal disódica)		
Uridín-5'-monofosfato disódico (UMP sal disódica) en total	3 mg	6 mg
(equivalente a 1,330 mg de Uridina y 2,660 mg de Uridina, respectivamente)		
Excipiente	c.s.	c.s.

Por ampolla disolvente:
 Cloruro sódico
 Vehículo acuoso c.s. 2 ml

Indicaciones
 Tratamiento de las neuropatías de origen osteoarticular (ciática, radiculitis, etc.), metabólico (polineuritis diabética, alcohólica, etc), infeccioso (herpes zóster) y a frigore, Neuralgia del Facial, Trigemino, Intercostal, Lumbago.

Posología, forma y duración del tratamiento
Núcleo CMP Forte inyectables se administra por vía intramuscular.
 Adultos: 1 inyectable diario por vía intramuscular.
 Niños: 1 inyectable cada 2 días por vía intramuscular.
Núcleo CMP Forte cápsulas se administra por vía oral.
 Adultos: 1 ó 2 cápsulas 2 veces al día.
 Niños: 1 cápsula 2 veces al día. Según criterio médico.

Precauciones de empleo (Inyectables)
 Introducir la totalidad del contenido de la ampolla disolvente en la ampolla liofilizada, agitar hasta disolver totalmente el contenido de esta. Inyectar por vía intramuscular.

Contraindicaciones
 No se conocen. A menos que exista una alergia a cualquiera de los componentes.

Reacciones adversas
 No se han descrito, pero si se produce cualquier reacción adversa achacable a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Interacciones
 No se conocen.

Uso en el embarazo
 No está contraindicado su uso en embarazo, no obstante, se aconseja que la pauta de administración sea establecida por el médico.

Medidas a tomar en caso de sobredosis
 Dada la escasa toxicidad del preparado no se prevé la intoxicación ni aún la accidental.

Forma farmacéutica y contenido.
 - Envase conteniendo 3 ampollas liofilizadas y 3 ampollas disolventes.
 - Envase conteniendo 30 cápsulas.

Condiciones de conservación y plazo de validez.
 Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños

280mm

Núcleo C.M.P. Forte

Activity
Núcleo CMP Forte provides the phosphate groups necessary for the union of the monosaccharides with ceramins, to form the cerebroside and phosphatidic acids constituting the sphingomyelin and glycerophospholipids, main components of the myelin sheath, thus achieving greater trophic properties for the maturation and axonal regeneration of the nervous tissue.

Composition

	Per capsule	Per lyophilized ampoule
Cytidine-5'-disodium monophosphate (CMP disodium salt).....	5 mg	10 mg
Uridine-5'-trisodium triphosphate (UTP trisodium salt)		
Uridine-5'-disodium diphosphate (UDP disodium salt)		
Uridine-5'-disodium monophosphate (UMP disodium salt) on the whole ...	3 mg	6 mg
(equivalent to 1.330 mg of Uridine and 2.660 mg of Uridine, respectively)		
Excipient	q.s.	q.s.

Per ampoule of solvent:
 Sodium chloride
 Aqueous vehicle, q.s. 2 ml.

Indications
 Treatment of neuropathies of osteoarticular (sciatica, radiculitis, etc.), metabolic (diabetic, alcoholic polyneuritis, etc.), infectious (herpes zoster) origin, and a frigore, Neuralgia of the Facial, Trigeminal, Intercostal, Lumbago.

Dosage, form and duration of treatment
Núcleo CMP Forte injections is administered by intramuscular route.
 Adults: 1 injection daily by intramuscular route.
 Children: 1 injection every 2 days by intramuscular route.
Núcleo CMP Forte capsules is administered by oral route.
 Adults: 1 or 2 capsules 2 times daily.
 Children: 1 capsule 2 times daily. As prescribed by physician.

Precautions for use (Injections)
 Introduce the whole contents of the ampoule of solvent into the lyophilized ampoule, stir till completely dissolving the contents of the latter. Inject by intramuscular route.

28,3
10

	Escala 1:1	Código interno 5014882	Prospecto Núcleo C.M.P. Forte IFE IMA (1/2)	Nº Perfil M0283 P280X175 SP
	Material Papel tipo lito o rotoform blanco de 50g/m ²	Dimensiones 280x175 mm	Plegado Sin plegar	Fecha 28/11/14
Oficina Técnica	Referencia nº 5014882/1-1411	Anula a 3785/1-0411	Motivo Nueva creación, Cambio de máquina a Blister 9, control de cambios 253/2014-C. Añadir Revision date Jordania.	Prueba e
Aprobado:				Realización Ferrer/4
Fecha:	Tintas Negro (100%) Perfil			 171

12
175mm
14

10

171

10

sentido de lectura

50mm

↓

Contraindications
Are not known. Unless that there exists an allergy to any of the components.

Adverse reactions
Have not been described, but if any adverse reaction attributable to the taking of the medicament appears, consult your physician or pharmacist.

Interactions
Are not known.

Use during pregnancy
Its use during pregnancy is not contraindicated, however, it is recommended that the dosage pattern is established by the physician.

Measures to be taken in case of overdose
Given the scarce toxicity of the preparation, poisoning is not foreseen, even by accident.

Pharmaceutical form and contents
- Package containing 3 lyophilized ampoules and 3 ampoules of solvent.
- Package containing 30 capsules.

Conditions for the preservation and validity time
This medicament must not be used after the date of expiry stated on the package.

Medicaments must be kept out of reach and sight of children

Núcleo C.M.P. Forte

Activité
Le *Núcleo CMP Forte* apporte les groupes phosphate nécessaires dans l'union des monosaccharides avec les céramines, pour former les cérébrosides et les acides phosphatidiques qui constituent la sphingomyéline et les glycérophospholipides, principaux composants de la gaine de myéline, en obtenant ainsi de plus grandes propriétés trophiques pour la maturation et la régénération axonale du tissu nerveux.

Composition	Par capsule	Par ampoule lyophilisée
Cytidine-5'-monophosphate disodique (CMP sel disodique).....	5 mg	10 mg
Uridine-5'-triphosphate trisodique (UTP sel trisodique)		
Uridine-5'-diphosphate disodique (UDP sel disodique)		
Uridine-5'-monophosphate disodique (UMP sel disodique) au total	3 mg	6 mg
(équivalent à 1,330 mg d'Uridine et 2,660 mg d'Uridine, respectivement)		
Excipient	q.s.	q.s.

Par ampoule de dissolvant:
Chlorure de sodium
Véhicule aqueux, q.s. 2 ml.

Indications
Traitement des neuropathies d'origine ostéoarticulaire (sciatique, radiculite, etc.), métabolique (polynévrite diabétique, alcoolique, etc.), infectieuse (herpès zoster) et à frigore. Névralgie faciale, du trijumeau, intercostale, Lumbago.

Posologie, forme et durée du traitement
Le *Núcleo CMP Forte* injections est administré par voie intramusculaire.
Adultes: 1 injection par jour par voie intramusculaire.
Enfants: 1 injection tous les 2 jours par voie intramusculaire.
Le *Núcleo CMP Forte* capsules est administré par voie orale.
Adultes: 1 ou 2 capsules 2 fois par jour.
Enfants: 1 capsule 2 fois par jour. Selon l'avis du médecin.

Précautions d'emploi (Injections)
Introduire tout le contenu de l'ampoule de dissolvant dans l'ampoule lyophilisée, agiter jusqu'à dissoudre totalement son contenu. Injecter par voie intramusculaire.

Contre-indications
On n'en connaît pas. A moins qu'il existe une allergie à n'importe quel des composants.

Réactions adverses
Elles n'ont pas été décrites, mais s'il se produit n'importe quelle réaction adverse imputable à la prise du médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Interactions
On n'en connaît pas.

Utilisation pendant la grossesse
Son utilisation n'est pas contre-indiquée pendant la grossesse, cependant, on recommande que la règle d'administration soit établie par le médecin.

Mesures à prendre en cas de surdosage
Etant donné la rare toxicité de la préparation, on ne prévoit pas l'intoxication, même pas par accident.

Forme pharmaceutique et contenu
- Emballage contenant 3 ampoules lyophilisées et 3 ampoules de dissolvant.
- Emballage contenant 30 capsules.

Conditions de conservation et délai de validité
Ce médicament ne doit pas être utilisé après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Gardez les médicaments hors de la portée et de la vue des enfants

01/2005
Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Barcelona (España/Spain/Espagne) 5014882/1-1411

280mm

	Escala 1:1	Código interno 5014882	Prospecto Núcleo C.M.P. Forte IFE IMA (2/2)	Nº Perfil M0283 P280X175 SP
	Material Papel tipo lito o rotoform blanco de 50g/m ²	Dimensiones 280x175 mm	Plegado Sin plegar	Fecha 28/11/14
Oficina Técnica	Referencia nº 5014882/1-1411	Anula a 3785/1-0411	Motivo Nueva creación, Cambio de máquina a Blister 9, control de cambios 253/2014-C. Añadir Revision date Jordania.	Prueba e
Aprobado:				Realización Ferrer/4
Fecha:	Tintas Negro (100%) Perfil			 171