

 **BETA  
HEALTHCARE**  
An Aspen Group Company

## KOFLYN SYRUP®

**Generic name :** Cough Syrup.  
**Dosage form :** Syrup.

**Route of administration :** Oral

**Description:**

**Koflyn (Raspberry)** Pink, clear syrup with pleasant aroma.  
**Koflyn (Pineapple)** Light yellow, clear syrup with pleasant aroma.  
**Koflyn (Mixed fruit)** Orange, clear syrup with pleasant aroma.

**Contents of active ingredients :**

|                            |                             |          |
|----------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Each 5ml contains :</b> | Chlorpheniramine Maleate BP | 2.2 mg   |
|                            | Ammonium Chloride BP        | 110.0 mg |
|                            | Sodium Citrate BP           | 40.0 mg  |
|                            | Menthol BP                  | 1.1 mg   |

**Therapeutic class :** Antitussive and expectorant, combination.

**Indications :**

Koflyn is indicated for relief of bronchial congestion, colds and allergic bronchial congestion.

**Dosage regimen and directions for use :** As directed by the Physician OR

Use six hourly as below

- 0-1 year-2.5mls every 6 hours
- 1-5 years - 5mls every 6 hours
- 5-12 years - 7.5 mls every 6 hours
- Adults - 10 mls every 6 hours

**Contra-indications :**

Koflyn is contraindicated in patients who exhibit hypersensitivity to any of the components of the formula.

Koflyn is contraindicated to pregnant and breastfeeding mothers in high doses.

Koflyn should not be given to patients with metabolic or respiratory alkalosis.

**Side effects and adverse reactions :**

It can cause drowsiness, dizziness, vomiting or diarrhoea.

**Precautions and warnings :**

Koflyn should be given with extreme caution to patients with heart failure, oedema, renal impairment, hypertension and eclampsia. Do not take Koflyn and drive a car or operate machinery because it can cause drowsiness and dizziness. Keep the medicine out of reach of children.

**Symptoms and treatment of overdose :**

Overdosage requires emergency symptomatic treatment.

**Presentation :** :60 and 100 ml amber bottles.

**Storage conditions :** :Store in a dry place below 30°C Protect from light.

**Manufactured by:**



**Beta Healthcare International Limited**  
Plot No. LR 209/6554 Mogadishu Road, Industrial Area  
P.O Box 42569-00100 Nairobi, Kenya  
Tel: +254 20 2652042/89  
Website: www.betacare.co.ke  
Email: info@ke.betashelys.com

Lf/KFLN/004/DP

 **BETA  
HEALTHCARE**  
An Aspen Group Company

## KOFLYN® SIROP

**Nom générique :** Sirop de toux.

**Forme de dosage :** Sirop

**Voie de la administration :** Oral

**Description :**

**Koflyn (R) :** Rose, sirop clair avec l'arôme plaisant.

**Koflyn (P) :** Jaune sirop clair avec l'arôme plaisant.

**Koflyn (MF) :** Orange, sirop clair avec l'arôme plaisant.

**Contenu des substances actives :**

|                              |                             |          |
|------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Chaque 5ml contient :</b> | Chlorpheniramine Maleate BP | 2.2 mg   |
|                              | Chlorure d' Ammonium BP     | 110.0 mg |
|                              | Citrate Sodique BP          | 40.0 mg  |
|                              | Menthol BP                  | 1.1 mg   |

**Classe thérapeutique :** Antitussive et expectorant, combinaison.

**Indications :**

Koflyn est indiqué pour le soulagement de la congestion bronchique, des rhumes et de la congestion bronchique allergique.

**Schéma posologique et mode d'emploi :** Comme dirigé par le médecin OU

Employez toutes les six heures

**Posologie :**

**Adulte :** 2 cuillerée à café (10ml) chaque 6 heures.

**Enfants :** 5 à 12 ans – 1½ cuillerée à café (7.5ml) chaque 6 heures."

1 à 5 ans – 1 cuillerée à café (5ml) chaque 6 heures."

0 à 1 ans – 1/2 cuillerée à café (2.5ml) chaque 6 heures."

**Contra indications :**

Koflyn est contra indiqué dans les patients qui exhibent l'hypersensibilité à n'importe quels composants de la formule. Koflyn est contra indiqué à la grossesse et à l'allaitement au sein dans les doses élevés. Koflyn ne devrait pas être donné aux patients présentant l'alkalose

metabolique ou respiratoire

**Effets secondaires et réactions défavorables :**

Il peut causer la somnolence, le vertige, le vomissement ou la diarrhée.

**Précautions et avertissements :**

Koflyn devrait être donné avec l'attention extrême aux patients avec l'arrêt du coeur, l'oedème, l'affaiblissement rénal, l'hypertension et l'éclampsie. Ne conduisez pas une voiture ou n' actionnez pas la machine après avoir pris

Koflyn parce qu' elle peut causer la somnolence et le vertige. Gardez la médecine hors de portée des enfants.

**Les Symptômes et le Traitement de surdosage :**

Le surdosage exige le traitement symptomatique de secours.

**Presentation :** :Bouteille de 60 et 100 ml.

**Conditions de stockage :** :Stockez dans un endroit sec ayant une température moins de 30°C. Protégez contre la lumière.

**Manufactured by:**



**Beta Healthcare International Limited**  
Plot No. LR 209/6554 Mogadishu Road, Industrial Area  
P. O. Box 42569-00100 Nairobi, Kenya  
Tel: +254 20 2652042/89  
Website: www.betacare.co.ke  
Email: info@ke.betashelys.com