

**ACTIMAG®** PIDOLATE DE MAGNÉSIUM  
SOLUTION ORALE

COMPOSITION	Pour 1 ml	Pour 5 ml
Pidolate de magnésium .....	0,4 g	2 g
Saccharine sodique .....	8 mg	40 mg
Saccharose .....	0,35 g	1,75 g

P-hydroxybenzoate de méthyle, p-hydroxybenzoate de propyle, propylèneglycol, arôme à la menthe, arôme à la framboise, colorant carmoisine (E-122), eau, q.s.  
Chaque ml d'ACTIMAG (pidolate de magnésium) apporte 0,035 grammes de magnésium élément.



**INDICATIONS.**

ACTIMAG constitue un traitement efficace pour le déficit en magnésium, sous n'importe laquelle de ses formes, parce que la pénétration intra-cellulaire du cation magnésique en tant que pidolate est rapide et pratiquement totale.

**CONTRE-INDICATIONS.**

Insuffisance rénale non compensée ou aiguë. Miasthénie grave. Coma diabétique. Maladie de Cushing.

**PRÉCAUTIONS.**

À employer avec précaution chez les patients ayant des altérations du métabolisme du calcium.

**MISES EN GARDE**

**IMPORTANT CHEZ LA FEMME:**

Chez la femme enceinte, ou susceptible de l'être, prendre l'avis d'un médecin avant d'utiliser ce médicament. La consommation de médicaments pendant la grossesse peut être dangereuse pour l'embryon ou le fœtus et doit être contrôlée par un médecin.

Ce médicament contient du saccharose (0,35 g par ml et 1,75 g pour 5 ml), et les malades diabétiques doivent le prendre avec précaution.

**INCOMPATIBILITÉS.**

Pour éviter un phénomène d'inhibition compétitive il ACTIMAG ne doit pas être administré simultanément avec une thérapie calcique. Par contre on peut administrer ce genre de thérapie quelques jours avant ou après la prise d'ACTIMAG.

**EFFETS INDÉSIRABLES.**

On n'en connaît pas aux doses thérapeutiques normales.

**INTOXICATION ET SON TRAITEMENT.**

En cas de surdosage accidentel, réaliser un lavage gastrique et instaurer un traitement symptomatique. En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, veuillez consulter le Service Toxicologique.



**POSOLOGIE.**

Chez l'adulte la posologie recommandée est de 0,35 g de magnésium élément par jour, c'est à dire, 5 ml de solution orale deux fois par jour. Chez l'enfant la dose recommandée est de 0,175 g de magnésium élément toutes les 24 heures, c'est à dire, 5 ml de solution orale toutes les 24 heures. Ces dosages peuvent être augmentés en cas de déficit important en magnésium.

**PRÉSENTATION.**

Flacon de 100 ml. Avec mesurette. Voie orale.

**Médicament non soumis à prescription médicale.**

**Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.**



**ACTIMAG<sup>®</sup>** MAGNESIUM PIDOLATE  
ORAL SOLUTION

COMPOSITION	In 1 ml	In 5 ml
Magnesium pidolate.....	0.4 g	2 g
Sodium saccharine .....	8 mg	40 mg
Saccharose .....	0.35 g	1.75 g

Methyl p-hydroxybenzoate, propyl p-hydroxybenzoate, propylene glycol, piperite mint flavor, raspberry flavor, colouring matter carmoisin (E-122), water, s.q.

Each ml of ACTIMAG (magnesium pidolate) provides 0.035 grams of magnesium.

**INDICATIONS.**

ACTIMAG is an effective treatment of magnesium deficiency, in any of its forms, since intracellular penetration of magnesium ion as pidolate is virtually total and fast.

**CONTRAINDICATIONS.**

Decompensated or acute renal failure. Myasthenia gravis. Diabetic coma. Cushing's disease.

**PRECAUTIONS.**

ACTIMAG must be used with caution in patients with calcium metabolism disorders.

**WARNINGS**

**IMPORTANT FOR WOMEN:**

If you are pregnant or you think you could be pregnant, consult your doctor before taking this drug. The use of drugs during pregnancy can be dangerous for the embryo or fetus and must be monitored by your doctor.

This proprietary drug contains saccharose -0.35 mg per 1 ml and 1.75 g per 5 ml-, which must be taken into account by diabetic patients.

**INCOMPATIBILITIES.**

To avoid a competitive inhibition phenomenon, it must not be administered with concomitant calcium therapy. This can be given before or after ACTIMAG with a few days' interval.

**SIDE EFFECTS.**

Side effects have not been reported after normal use at therapeutic doses.

**OVERDOSAGE AND ITS TREATMENT.**

In case of accidental overdose, gastric lavage and symptomatic treatment must be applied. In case of overdose or accidental intake, consult the Toxicology Information Service.

**DOSAGE.**

The usual dosage in adults is 0.35 g of magnesium daily, equal to 5 ml of oral solution two times daily. In children, the usual dose is 0.175 g of magnesium daily, equal to 5 ml of oral solution every 24 hours. These dosages may be increased in cases of major magnesium deficiency.

**HOW SUPPLIED.**

Bottle containing 100 ml with a dosing cup. Oral way.

**Medicinal product not subject to medical prescription.**

**Keep out of reach and sight of children.**

**Fabricant et titulaire / Manufacturer and Product licence holder:**

FAES FARMA, S.A.  
Máximo Aguirre, 14 - 48940 Leioa (Vizcaya)  
ESPAGNE / SPAIN

