

corticoids pass in the maternal milk.

MEDICINAL INTERACTIONS :

You should inform your doctor about the drugs that you take and especially : cardiologic drugs, drugs decreasing the blood potassium, aspirin, anticoagulant, anti-diabetic, Phenobarbital, phenitoin, primidone or rifamycin.

Let know your doctor if you are in period of de vaccination.

ADVERSE EFFECTS :

Those of the corticotherapy, included water and sodium retention, hypertension, congestive cardiac insufficiency, osteoporosis, peptic ulcer, delay of cicatrization, aggravation of diabetic. Menstrual irregularities, decrease of the resistance of infection, increase of weight and glaucoma.

Let know your doctor about any unusual sensation.

DOSEAGE AND MODE OF ADMINISTRATION :

Mode of administration : intravenous or intramuscular route, local injection (intra-articular, soft tissue).

Dosage : To conform to the medical prescription

DELIVERY CONDITIONS :

List I, table A, delivered strictly on medical prescription

CONSERVATION :

Keep away from light, heat and cold.

PRESERVATION :

Dexamethasone MedIS Box of 50 ampoules of 1 ml 923 313 2 H

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer:

LES LABORATOIRES MEDIS

Tunis road - KM 7 - BP 206 - 8000 Nabeul - Tunisia

Tel : (216) 72 23 50 06. Fax: (216) 72 23 50 16.

E-mail : contact@labomedis.com

Date of the last revision : 09/2019

This is a drug

- A drug is a specific product agent.
- A drug is a product acting on your health and its use, contrary to prescriptions may be dangerous for you.
- Strictly respect the doctor's prescription and the instructions of use he has prescribed.
- Follow your pharmacist's advice on the use, its indications and contra-indications.
- Do not discontinue the drug intake by yourself during the prescription period.
- Do not repeat the prescription or increase the dosage without consulting your doctor.

KEEP ANY DRUG OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

NO BENT
VUE



الحمل ، بالنسبة للجنس البشري لم تظهر الدراسات أي تفاعل عند الجنين في

حالة استعمال الدواء في الثلاث أشهر الأولى من الحمل لكن يمكن حصول

فسور في السورينال عند المولود الجديد في حالات الإبراط في الجرغ.

الإرضاع ؛ يجب تجنّب الإرضاع عند تناول الدواء لأنه يتسرب مع حليب الأم.

التداخلات الدوائية :

ينبغي إعلام الطبيب في حالة الخضوع لعلاج منظم أو عرضي. خاصة بالنسبة للأدوية التالية : دواء القلب. دواء مخفض ليوناسيوم الدم. أسبيرين. دواء مضاد التخثر. دواء مخفض للسكري. فينوبريبیتال. فينوبريبیتال. فينوتوان. برميديون. ريفاميسين.

أبلغوا طبيبكم إذا ما كنتم في فترة التلقيح.

التأثيرات الجانبية ؛ خاصة بالمعالج الكورتيكويدي خاصة انحباس

الصوديوم، ارتفاع الضغط الشراييني. قصور قلبي. تخلل العظم. قرحة

عضمية. بطئ التئام الجروح، اشتداد داء السكري. اختلال العادة الشهرية.

تنقص مقاومة العدوى. ازدياد الوزن. زرق العين.

في حالة حدوث هذه الأعراض اتصلوا بالطبيب حالا.

المقادير وطريقة الاستعمال ؛ يجب التقيد بالوصفة الطبية.

الحقن في العضل، في الوريد مباشرة. حقن موضعي (مفصل...).

طريقة الصرف ؛ قائمة A (جدول A) بصرف بوصفة طبية.

طريقة الحفظ ؛ بعيدا عن الضوء، عن الحرارة والرطوبة.

التقديم ؛

دكزاميتازون ميديس عليه ذات 50 حياية 1 مل. تأشيرة رقم 923 313 2H

إن هذا دواء

- دواء مستعمل ولكن ليس كغيره من المستعملات.
- دواء مستعمل يؤثر على صحتك واستعماله خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- تتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال الممنوعين عليها.
- تأخذ تعليمات الصيدلاني الذي يوصف لك هذا الدواء. الطبيب والمصنعي هما الضمان بالدواء وبفعله وبسرته.
- لا تأخذ هذا الدواء إلا بوصفة من طبيبك.
- لا تأخذ دواء آخر عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

دكزاميتازون ميديس

دكزاميتازون فوسفات

الشكل والتقديم ؛

دكزاميتازون ميديس ؛ حياية محلول للحقن 4 مغ / 1 مل - عالية تحتوي على 50 حياية 1 مل.

التركيبة ؛	دكزاميتازون ميديس
دكزاميتازون فوسفات الصوديوم	4,37 مغ
ب- هيدروكسيبنزوات الصوديوم	1,5 مغ
ب- هيدروكسيبنزوات البوتاسيوم	0,2 مغ
المواد الحافظة ؛ إيثانول، ديسوديوم، سترات الصوديوم، تريازولون، بهيدرات كارباميد، لاسك، ماء، مستحضر الحفظ لتعديلي	1 مل

الخصائص الدوائية ؛

ستيرويد اصطناعي مضاد للالتهاب

دواعي الاستعمال ؛

حالات العلاج الكورتيكويدي النظامي أو العرضي في حالات العلاج النسيجي أو المكتف.

موانع الاستعمال ؛ الخاصة بالعلاج الكورتيكويدي وعلى وجه الخصوص حساسية لأحد عناصر هذا الدواء.

استعمال التلقيح ذات الفيروس الحي.

حالات التعفن أو الإصابة الفطرية أو الفيروسية الغير مسيطر عليها بالدواء.

القرص. الحرق الهضمي التام.

حالة الهذيان.

التأثير الكبدية نتيجة الإدمان على الكحول.

كبد حاد فيروسى أ ب ج.

الاصابات الجلدية المصنعية.

احتياطات الاستعمال ؛ في حالة تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو العنجرة، اتصل فورا بالطبيب.

يوجب الحذر في الحالات التالية ؛ مرض السكري. قصور الكلى. التهاب

القرظون. اعتلال عضلي حاد. قرحة عضمية. ارتفاع الضغط الشراييني. تخلل

العظم. اشتداد حاد لشرايين القلب.

بالنسبة للحقن الموضعي يجب تجنّب الحقن في العضل غير المستقرّة.

في حالة الحقن الموضعي وعند ظهور تورم أو ارتكاه المفضل أو حمى أو أي

أعراض كان. يجب اشعار الطبيب المباشر.

Sogim

Notre Qualité

2019

Client : Medis

Customer: Waleh RHALFALLAN

Designation : DEXAMETHASONE MEDIS

4MG-1ML

Format : 15 x 23 cm

Impression : 1 couleur recto verso

Impression : Imprimerie CSA, Illustration CSA,

Opérateur : MARINA KARINA

Dimensionnement de papier : 80g

Date : 16-09-2019

Code article : N00047

Versions : 02

Couleur : Bleu 290C

Police : Times

Cargo : 6

Intelligence : 8

Prepiloté avec bande

Signature client

B.A.T