

• Giardiasis :  
Enfants : 30 mg/kg/j, en une prise unique.

#### Mode et voie d'administration

Voie orale.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER CONSEIL AUPRES  
DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré  
Prendre au début des repas.

#### Durée du traitement

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

#### Effets non souhaités et gênes

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Troubles digestifs (nausées, douleurs d'estomac), goût métallique dans la bouche, glossite (inflammation de la langue), stomatite (inflammation de la cavité buccale).
- Rares réactions allergiques immédiates : fièvre, rougeur, urticaire, œdème de Quincke (gonflement du visage) (voir DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT).
- Rarement : vertiges, troubles nerveux sensitifs et moteurs.
- Leucopénie (taux anormalement bas de globules blancs dans le sang) modérée réversible à l'arrêt du traitement.

IL FAUT SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

#### Conseil de conservation

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.  
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

#### Date de révision de la notice

Septembre 2015.

# Flagentyl® 500 mg

secnidazole

Scored film-coated tablet

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any questions or are unsure of anything, ask your doctor or pharmacist for more information.
- This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects becomes serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

WHAT Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets ARE

#### Composition

Active substance: per tablet  
Secnidazole ..... 500 mg  
Excipients: calcium hydrogen phosphate, microcrystalline cellulose, wheat starch, hydrated silica, sodium starch glycolate, gelatin, magnesium stearate, hypromellose.

#### Pharmaceutical form and presentation

500 mg scored film-coated tablets, box of 4.

#### Pharmacotherapeutic group

ANTIPARASITIC, ANTIPROTOZOAL AGENT, TISSUE AMEBICIDE, CONTACT AMEBICIDE, (P: Parasitology).

#### Marketing Authorization Holder and Operating Company

sanofi-aventis France  
82, avenue Raspail  
94250 Gentilly - France  
France

#### Manufacturer

FAMAR LYON  
29 avenue Charles de Gaulle  
69230 Saint Genis Laval - France

WHAT Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets ARE USED FOR

#### This medicine is recommended in the treatment of:

- urethritis and vaginitis due to Trichomonas vaginalis,
- intestinal amebiasis and hepatic amebiasis,
- giardiasis.

#### BEFORE YOU TAKE Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets

#### This medicine should not be used in the following cases

DO NOT TAKE Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets if you are:

- allergic to imidazole derivatives or to any of the ingredients in the medicine,
- breast-feeding,
- allergic to wheat since this medicine contains wheat starch.

IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, IT IS ESSENTIAL THAT YOU ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

2

في حال الشك من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

#### التفاعلات الدوائية وتفاعلات أخرى

لقد أدى تفاعلات بين أدوية مختلفة لا سيما الميسوليمبرام، يجب عليك دائمًا إعلام الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر تخضع له.

Flagentyl®

فلاجنتيل® 500 ملغ

سيستيدازول

فوسفات هدرجين الكلسيوم، سلولوز دقيق البليوروبية، نشا القمح، سيليكون

منتهية، كاربوسيبيتيل شاش الصوديوم، هيروميلون.

تعريف الدواء

التركيب

المادة الفاعلة: في القرص الواحد

سيستيدازول.....500 ملغ

الأسophage: فوسفات هدرجين الكلسيوم، سلولوز دقيق البليوروبية، نشا القمح، سيليكون

منتهية، كاربوسيبيتيل شاش الصوديوم، هيروميلون.

شكل الصيدلاني والعبوة

قرص قابل للقطع مغلف بطبقة رقيقة من 500 ملغ، عليه من 4 أقراص.

#### العمل والارضاع

يُفضل عدم استخدام هذا الدواء خلال فترة الحمل والإرضاع.

إذا اكتشفت أنك حامل في خلال فترة الحمل والإرضاع، استشيري الطبيب لأنه الوحيد قادر على اتخاذ القرار بشأن مناسبة العلاج أو لا.

بصورة عامة، يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء في فترة الحمل والإرضاع.

#### ساققو السيارات ومغلو الألات

في حالات نادرة أفيد عن تعرض لدواء بعد تناول مشتقات الإيميدازول.

#### لانحة الأسوغة التي لها تأثير معروف

نشا القمح (غلوتين)

#### كيف يجب مستعمل هذا الدواء

#### مقدار الجرعة

يسحب حجمه وشكله الصيدلاني، ليس قرص فلامجنتيل 500 ملغ مناسًى للاستعمال لدى الأطفال ما دون السادسة من العمر.

كتفاسدة عامة:

#### • إلتهاب الأحليل والتهاب الميبل:

- البالغون: 4 أقراص (أي 2 غ) تؤخذ كجرعة واحدة في بداية الطعام.

#### • داء الأميبيا الموقنة:

- البالغون: 4 أقراص (أي 2 غ) تؤخذ كجرعة واحدة في بداية الطعام.

- الأطفال: 30 مل/كغم/اليوم، تؤخذ كجرعة واحدة في يوم واحد.

- داء الأميبيا غير الموقنة: الجرعة اليومية ذاتها لثلاثة أيام.

#### • داء الأميبيا الكبدية:

- البالغون: 3 أقراص يومياً (أي 1.5 غ/اليوم).

- الأطفال: 30 مل/كغم/اليوم، تؤخذ كجرعة واحدة أو عدة جرعات في بداية الطعام لخمسة أيام.

#### • داء الجيارديات:

الأنفلان: 30 مل/كغم/اليوم كجرعة واحدة.

#### طريقة الأخذ

عن طريق الفم.

في حال الشك لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

#### عدد مرات الأخذ والوقت الذي يجب فيه أخذ الدواء

خذ الدواء في بداية الطعام.

#### مدة العلاج

تقيد بدقة بوصفة الطبيب.

#### التأثيرات غير المرغوب بها والمزعجة

كما مع أي دواء، قد يكون لهذا الدواء تأثيرات تسبب إزعاجًا متوافر الحدّ لدى بعض المرضى:

- اضطرابات معتمبة (خثيان، آلم في المعدة)، طفح معدني في الفم،

- التهاب اللسان، التهاب الفم (التهاب تجويف الفم).

- ارتكاسات تحسسية نادرة هورغة، حمى، أحمرار، شرى وأوجيema كوبينك (نقرس الوجه) (راجع قسمة «في أي حالات لا ينبغي استخدام هذا الدواء»).

- نادرًا: دوار، اضطرابات عصبية حسية وحرقافة.

#### الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المشغلة

sanofi-aventis France

82, avenue Raspail

94250 Gentilly - France

#### المصنع

FAMAR LYON

29 avenue Charles de Gaulle

69230 Saint Genis Laval – France

#### ما هي دواعي استخدام هذا الدواء

يوصى باستخدام هذا الدواء في علاج:

- إلتهاب الأحليل والتهاب الميبل بسبب المشربة.

- داء الأميبيا الموقنة، داء الأميبيا الكبدية.

- داء الجيارديات.

#### تحذيرات

في أي حالات لا ينبغي استخدام هذا الدواء:

- لا ينبغي استخدام هذا الدواء في الحالات التالية:

- حساسية ضده مشتقات الإيميدازول أو ضد أي مركب من مشتقات الإيميدازول.

- في خلال فترة الإرضاع.

- إذا كنت مصابًا بحساسية ضده القمح بما أن هذا الدواء يحتوى على نشا القمح.

في حال الشك من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

#### محاذير الاستعمال

يجب عليك تجنب المشروبات الكحولية في خلال فترة العلاج.

يمكن إعطاء هذا الدواء إذا كنت مصابًا ببعض الأضطرابات الهضمية.

يشترط القمح على الملعون ولكن بكميات ضئيلة وبالتالي يُعتبر آمنًا للمرضى المصابين

ببعض الأضطرابات الهضمية.

52 31038732

31038733

## **Take special care with Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets**

You should avoid alcoholic drinks during treatment.

Inform your doctor if you have a history of blood disorders.

This medicine can be administered if you have celiac disease. Wheat starch can contain gluten, but only traces, and is therefore considered safe for patients with celiac disease.

**IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, IT IS ESSENTIAL THAT YOU ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.**

## **Taking other medicines**

**TO AVOID ANY INTERACTION BETWEEN DIFFERENT MEDICINES, PARTICULARLY DISULFIRAM, YOU MUST ALWAYS INFORM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST OF ANY OTHER TREATMENT YOU MAY BE RECEIVING.**

## **Pregnancy and breast-feeding**

You should preferably not use this medicine during pregnancy and while breast-feeding.

If you discover that you are pregnant while taking this medicine, consult your doctor, as only he/she can determine whether you should continue treatment.

**AS A GENERAL RULE, DURING PREGNANCY OR BREAST-FEEDING, YOU SHOULD ALWAYS ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE BEFORE USING A MEDICINE.**

## **Driving and using machines**

Rarely, dizziness has been reported after taking imidazole derivatives.

## **List of excipients with a specific effect**

Wheat starch (gluten)

## **HOW TO TAKE Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets**

### **How many Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets should be taken**

Because of their size, Flagentyl 500 mg tablets are not suitable for use in children under 6 years of age.

As a general rule:

#### **• Urethritis and vaginitis:**

- Adults: 4 tablets (i.e. 2 g) taken as a single dose at the beginning of a meal.

#### **• Intestinal amebiasis:**

- Symptomatic acute intestinal amebiasis:
  - ° Adults: 4 tablets (i.e. 2 g) taken as a single dose at the beginning of a meal.
  - ° Children: 30 mg/kg/day as a single dose.  
The dose is to be taken for one day only.

- Asymptomatic intestinal amebiasis: the same daily dose for 3 days.

#### **• Hepatic amebiasis:**

- Adults: 3 tablets daily (i.e. 1.5 g/day).
- Children: 30 mg/kg/day.  
taken as one or several doses at the beginning of a meal for 5 days.

#### **• Giardiasis:**

- Children: 30 mg/kg/day as a single dose.

## **How Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets are taken**

Oral use.

**IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.**

## **When and how often Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets should be taken**

Take at the beginning of a meal.

## **How long Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets should be taken**

**STRICTLY FOLLOW YOUR DOCTOR'S PRESCRIPTION.**

## **POSSIBLE SIDE EFFECTS**

**AS WITH ANY MEDICINE, THIS SUBSTANCE MAY HAVE EFFECTS THAT CAUSE VARYING DEGREES OF DISCOMFORT IN SOME PATIENTS:**

- Digestive disorders (nausea, stomach pain), metallic taste in the mouth, glossitis (inflammation of the tongue), stomatitis (inflammation of the mouth).
- Rare immediate allergic reactions: fever, redness, hives and angioedema (swelling of the face) (see "This medicine should not be used in the following cases").
- Rarely: dizziness, sensory and motor nervous system disorders.
- Moderate leukopenia (abnormally low levels of white blood cells), which subsides when treatment is stopped.

**IF YOU NOTICE ANY UNWANTED AND UNPLEASANT EFFECTS NOT MENTIONED IN THIS LEAFLET, YOU MUST INFORM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.**

## **HOW TO STORE Flagentyl 500 mg scored film-coated tablets**

### **DO NOT EXCEED THE EXPIRY DATE INDICATED ON THE OUTER PACKAGING**

Keep out of the reach and sight of children.

Store at a temperature no higher than 25°C.

## **THIS LEAFLET WAS LAST REVISED IN**

September 2015.

- قلة كريات بixin معتمدة (معدلات منخفضة لكريات الدم البيixin بشكل غير طبيعي).  
تزول عند إيقاف العلاج.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي بأي تأثير غير مرغوب به ومتى ينبع غير مذكور في هذه النشرة.

الحفظ  
لا تستعمل الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العلبة الخارجية  
احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظفهم.  
احفظ الدواء في درجة حرارة لا تتعذر 25 درجة مئوية.

تاريخ مراجعة النشرة  
أيلول 2015

# **Flagentyl® 500 mg**

secnidazole

Comprimé pelliculé sécable

**SANOFI**

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## **Précautions d'emploi**

La consommation de boissons alcoolisées est à éviter au cours du traitement.  
Prévenir le médecin traitant en cas d'antécédent d'anomalie sanguine.

Ce médicament peut être administré en cas de maladie coeliaque. L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace, et est donc considéré comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie coeliaque.

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## **Interactions médicamenteuses et autres interactions**

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, ET NOTAMMENT AVEC LE DISULFIRAM, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

## **Grossesse - Allaitement**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.  
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

**D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.**

## **Conducteurs et utilisateurs de machines**

Rarement, des vertiges ont été signalés suite à l'administration de dérivés de l'imidazole.

**Liste des excipients ayant un effet notable**  
Amidon de blé (gluten).

## **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**

### **Posologie**

Le comprimé Flagentyl 500 mg, du fait de la taille de la forme pharmaceutique, n'est pas adapté à l'utilisation chez l'enfant de moins de 6 ans.

En général :

#### **• Urétrites et vaginites :**

- Adultes : 4 comprimés (soit 2 g), en une prise unique, au début d'un repas.

#### **• Amibiase intestinale :**

- Amibiase aigüe symptomatique :
  - ° Adultes : 4 comprimés (soit 2 g), en une prise unique, au début d'un repas,
  - ° Enfants : 30 mg/kg/j, en une prise unique, dose à prendre un seul jour.
- Amibiase asymptomatique : même dose quotidienne pendant 3 jours.

#### **• Amibiase hépatique :**

- Adultes : 3 comprimés par jour (soit 1,5 g/j),
- Enfants : 30 mg/kg/j, en une ou plusieurs prises, au début des repas pendant 5 jours.

31038752