

07/05/2020

<b>BLISS GVS PHARMA LTD.</b>		Market: IMEX (FR + PT + EN)	Size: (L x H) 282 x 280 mm
Product: CLAVUJECT 1.2 G INJECTION	Component: Leaflet	Artwork code:38001729-01	Pack Size: 1 Vial
Color Shades: Black	Barcode: N-A	Date of Initiation 26.03/2020	Mfg Location: Inject Care
Reason for Issue: Change in Text	Designer Ramesh	Substrate: 40 gsm Bible paper	
G:\IMEX 3 Language Port-F-ENG\CLAVUJECT 1.2 G. INJECTION\ Clavuject 1.2 g. INJ CARTON LABEL		Superseded Code : 38001729	
		ARF No.:20161412	

**Resumo de informações para o utilizador**

**CLAVUJECT® 1,2 g**

Amoxicilina 1000 mg / Ácido clavulânico 200 mg

**Leia com atenção este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informações importantes para si.**

- Conserve este folheto. Pode ser necessário de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento prescrito para si, não é idêntico a outros. O medicamento pode ser ilicito se for utilizado por outras pessoas.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**1. Que é o CLAVUJECT® e para que é utilizado**

O CLAVUJECT® é um antibiótico que mata as bactérias responsáveis por infeções. Este medicamento é utilizado para tratar infeções causadas por bactérias sensíveis a este medicamento.

**2. O que precisa de saber antes de tomar CLAVUJECT®**

- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin

**3. Como tomar CLAVUJECT®**

Tomar este medicamento com água, com ou sem alimentos.

**4. Efeitos secundários possíveis**

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**5. Como guardar CLAVUJECT®**

Manter este medicamento em temperatura ambiente (15°C a 25°C).

**6. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

**7. Gravidez, aleitamento e fertilidade**

Consulte o seu médico antes de tomar este medicamento e informe-o se estiver grávida, se planeia engravidar ou se estiver a amamentar.

**8. Condição de utilização e capacidade de conduzir**

O CLAVUJECT® pode causar alguns efeitos secundários que podem prejudicar a capacidade de conduzir um veículo ou operar maquinaria se não se sentir bem.

**9. Outros medicamentos que toma**

Não pode administrar este medicamento a si mesmo. Será administrado por uma pessoa qualificada, como um médico ou enfermeiro.

**10. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos específicos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

**11. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos específicos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

**Resumo de informações para o utilizador**

**CLAVUJECT® 1,2 g**

Amoxicilina 1000 mg / Ácido clavulânico 200 mg

**Leia com atenção este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informações importantes para si.**

- Conserve este folheto. Pode ser necessário de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento prescrito para si, não é idêntico a outros. O medicamento pode ser ilicito se for utilizado por outras pessoas.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**1. Que é o CLAVUJECT® e para que é utilizado**

O CLAVUJECT® é um antibiótico que mata as bactérias responsáveis por infeções. Este medicamento é utilizado para tratar infeções causadas por bactérias sensíveis a este medicamento.

**2. O que precisa de saber antes de tomar CLAVUJECT®**

- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin

**3. Como tomar CLAVUJECT®**

Tomar este medicamento com água, com ou sem alimentos.

**4. Efeitos secundários possíveis**

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**5. Como guardar CLAVUJECT®**

Manter este medicamento em temperatura ambiente (15°C a 25°C).

**6. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

**7. Gravidez, aleitamento e fertilidade**

Consulte o seu médico antes de tomar este medicamento e informe-o se estiver grávida, se planeia engravidar ou se estiver a amamentar.

**8. Condição de utilização e capacidade de conduzir**

O CLAVUJECT® pode causar alguns efeitos secundários que podem prejudicar a capacidade de conduzir um veículo ou operar maquinaria se não se sentir bem.

**9. Outros medicamentos que toma**

Não pode administrar este medicamento a si mesmo. Será administrado por uma pessoa qualificada, como um médico ou enfermeiro.

**10. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos específicos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

<b>BLISS GVS PHARMA LTD.</b>		Market: IMEX (FR + PT + EN)	Size: (L x H) 282 x 280 mm
Product: CLAVUJECT 1.2 G INJECTION	Component: Leaflet	Artwork code:38001729-01	Pack Size: 1 Vial
Color Shades: Black	Barcode: N-A	Date of Initiation 26.03/2020	Mfg Location: Inject Care
Reason for Issue: Change in Text	Designer Ramesh	Substrate: 40 gsm Bible paper	
G:\IMEX 3 Language Port-F-ENG\CLAVUJECT 1.2 G. INJECTION\ Clavuject 1.2 g. INJ CARTON LABEL		Superseded Code : 38001729	
		ARF No.:20161412	

**Resumo de informações para o utilizador**

**CLAVUJECT® 1,2 g**

Amoxicilina 1000 mg / Ácido clavulânico 200 mg

**Leia com atenção este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informações importantes para si.**

- Conserve este folheto. Pode ser necessário de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento prescrito para si, não é idêntico a outros. O medicamento pode ser ilicito se for utilizado por outras pessoas.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**1. Que é o CLAVUJECT® e para que é utilizado**

O CLAVUJECT® é um antibiótico que mata as bactérias responsáveis por infeções. Este medicamento é utilizado para tratar infeções causadas por bactérias sensíveis a este medicamento.

**2. O que precisa de saber antes de tomar CLAVUJECT®**

- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin

**3. Como tomar CLAVUJECT®**

Tomar este medicamento com água, com ou sem alimentos.

**4. Efeitos secundários possíveis**

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**5. Como guardar CLAVUJECT®**

Manter este medicamento em temperatura ambiente (15°C a 25°C).

**6. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

**7. Gravidez, aleitamento e fertilidade**

Consulte o seu médico antes de tomar este medicamento e informe-o se estiver grávida, se planeia engravidar ou se estiver a amamentar.

**8. Condição de utilização e capacidade de conduzir**

O CLAVUJECT® pode causar alguns efeitos secundários que podem prejudicar a capacidade de conduzir um veículo ou operar maquinaria se não se sentir bem.

**9. Outros medicamentos que toma**

Não pode administrar este medicamento a si mesmo. Será administrado por uma pessoa qualificada, como um médico ou enfermeiro.

**10. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos específicos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

**Resumo de informações para o utilizador**

**CLAVUJECT® 1,2 g**

Amoxicilina 1000 mg / Ácido clavulânico 200 mg

**Leia com atenção este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informações importantes para si.**

- Conserve este folheto. Pode ser necessário de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento prescrito para si, não é idêntico a outros. O medicamento pode ser ilicito se for utilizado por outras pessoas.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**1. Que é o CLAVUJECT® e para que é utilizado**

O CLAVUJECT® é um antibiótico que mata as bactérias responsáveis por infeções. Este medicamento é utilizado para tratar infeções causadas por bactérias sensíveis a este medicamento.

**2. O que precisa de saber antes de tomar CLAVUJECT®**

- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
- Não tome CLAVUJECT® se estiver a tomar qualquer um dos seguintes medicamentos:
  - Clotrimazol
  - Fluconazol
  - Isoniazida
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin
  - Rifamicina
  - Rifampina
  - Rifapirina
  - Rifabutin

**3. Como tomar CLAVUJECT®**

Tomar este medicamento com água, com ou sem alimentos.

**4. Efeitos secundários possíveis**

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**5. Como guardar CLAVUJECT®**

Manter este medicamento em temperatura ambiente (15°C a 25°C).

**6. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

**7. Gravidez, aleitamento e fertilidade**

Consulte o seu médico antes de tomar este medicamento e informe-o se estiver grávida, se planeia engravidar ou se estiver a amamentar.

**8. Condição de utilização e capacidade de conduzir**

O CLAVUJECT® pode causar alguns efeitos secundários que podem prejudicar a capacidade de conduzir um veículo ou operar maquinaria se não se sentir bem.

**9. Outros medicamentos que toma**

Não pode administrar este medicamento a si mesmo. Será administrado por uma pessoa qualificada, como um médico ou enfermeiro.

**10. Outros medicamentos que toma**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente os seguintes ou outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica:

- Outros antibióticos específicos (por exemplo, tetraciclina, sulfonamidas ou doxorrifina);
- Outros medicamentos para tratar a gripe;
- Aspirina (para a dor);
- Anticoagulantes específicos (warfarina);
- Metformina.

