ANASTROZOLE NEAPOLIS®

ANASTROZOLE 1 mg

Comprimé pelliculé - Anastrozole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle renfermes des informations importantes pour vous

1. Gardez cette notice. Vous pouvez avoir besoin de la relire.
2. Si vous avez d'autres questions, demandez-en plus à votre médecin ou votre pharmacien.
3. Ce médicament a été prescrit pour votre traitement. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur nuire, même si elles ont des signes de maladie identiques aux vôtres.
4. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique – code ATC: L02BG03.

ANASTROZOLE NEAPOLIS contient une substance appelée anastrozole. Il appartient à un groupe de médicaments appelés « inhibiteurs de l'aromatase ». ANASTROZOLE NEAPOLIS est utilisé dans le traitement du cancer du sein de la femme ménopausée.

ANASTROZOLE NEAPOLIS agit en diminuant la quantité d'une hormone appelée œstrogène que votre corps fabrique. Il inhibe cela en bloquant une substance naturelle (un enzyme) de votre corps appelé « aromatase ».

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais ANASTROZOLE NEAPOLIS

- si vous êtes allergique à l'anastrozole ou à l'un des autres ingrédients contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez (voir la rubrique appelée « Grossesse et allaitement»).

Ne prenez pas ANASTROZOLE NEAPOLIS si l'une des situations ci-dessus vous concerne. Si vous avez un doute, vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ANASTROZOLE NEAPOLIS.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmière avant de prendre ANASTROZOLE NEAPOLIS :

- si vous avez des problèmes graves de foie ou de reins.
- si vous prenez un médicament qui contient du tamoxifène ou des médicaments qui contiennent des œstrogènes (voir rubrique « Autres médicaments et ANASTROZOLE NEAPOLIS »).
- si vous avez des problèmes de santé qui affectent la solidité de vos os (ostéoporose).
- si vous avez des problèmes avec votre foie (voir rubrique 4).

Si l'une des situations ci-dessus vous concerne, ou si vous avez un doute, vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ANASTROZOLE NEAPOLIS.

Si vous êtes hospitalisé, informez le personnel de l'hôpital que vous prenez ANASTROZOLE NEAPOLIS.

Autres médicaments et ANASTROZOLE NEAPOLIS

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre d'autres médicaments. Cela comprend des médicaments achetés sans ordonnance ou des médicaments à base de plantes. En effet, ANASTROZOLE NEAPOLIS peut affecter la façon dont certains médicaments agissent, et certains médicaments peuvent avoir un effet sur ANASTROZOLE NEAPOLIS.

Ne prenez pas ANASTROZOLE NEAPOLIS si vous prenez déjà un des médicaments suivants :

- Certains médicaments utilisés dans le traitement du cancer du sein (modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes) tels que les médicaments contenant du tamoxifène. Ces médicaments peuvent empêcher ANASTROZOLE NEAPOLIS d'agir correctement.
- Un médicament à base d'œstrogène, par exemple pour un traitement hormonal de substitution (THS).

Si vous prenez l'un de ces médicaments, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, dites-le à votre médecin ou à votre pharmacien :

- Un médicament appelé analogue de la LHRH (goseréline, leupréline, gonadoréline, leuproréline et triptoréline). Ces médicaments sont utilisés pour le traitement du cancer du sein, certaines maladies (gynécologiques) de la femme et la stérilité.

Grossesse et allaitement

ANASTROZOLE NEAPOLIS ne doit pas être utilisé en cas de grossesse ou d'allaitement. Arrêtez ANASTROZOLE NEAPOLIS en cas de survenue d'une grossesse et parlez-en à votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ANASTROZOLE NEAPOLIS ne devrait pas affecter votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des outils ou des machines. Cependant certaines personnes peuvent occasionnellement ressentir une fatigue ou une somnolence lors du traitement par ANASTROZOLE NEAPOLIS. Dans ce cas, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

ANASTROZOLE NEAPOLIS contient du lactose

ANASTROZOLE NEAPOLIS contient du lactose, qui est un sucre. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- La dose recommandée est d'un comprimé par jour.
- Avalez le comprimé entier (ne pas le mâcher ni le briser).
- Avalez le comprimé entier (ne pas le mâcher ni le briser).
- Vous pouvez prendre le comprimé avec ou sans aliments.

Continuez de prendre ANASTROZOLE NEAPOLIS aussi longtemps que votre médecin ou pharmacien vous le dit. C'est un traitement de longue durée et vous pourrez avoir besoin de le prendre pendant plusieurs années. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

ANASTROZOLE NEAPOLIS ne doit pas être donné aux enfants et aux adolescents.

Si vous avez pris plus d'ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé que vous n'aurez dû

Si vous avez pris plus d'ANASTROZOLE NEAPOLIS que vous n'aurez dû, avertissez aussitôt votre médecin.

Si vous oubliez de prendre ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez juste la dose suivante normalement le lendemain.

Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé :

Ne arrêtez pas de prendre vos comprimés sauf si votre médecin vous le dit.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmière.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas chez tout le monde.

Dans le premier ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé et ainsi de suite

ANASTROZOLE NEAPOLIS

ANASTROZOLE 1 mg

Comprimé pelliculé - Anastrozole

sur traitement médical urgent si vous ressentez l'un des effets indésirables graves suivants vous concernant :

- Une réaction soudainement sévère de la peau avec cloques ou choses. Cette réaction s'appelle « syndrome de Stevens-Johnson ».
- Réactions allergiques (hypersensibilité) avec un gonflement de la gorge qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer. Cette réaction s'appelle « angioœdème ».

Effets indésirables très fréquents (chez plus de 1 patients sur 10)

- Maux de tête.
- Bouffées de chaleur.
- Nausée (envie de vomir).
- Éruption cutanée.
- Douleur ou raideur articulaire.
- Inflammation des articulations (arthrite).
- Sensation de faiblesse.
- Perte osseuse (ostéoporose).

Effets indésirables fréquents (chez 1 à 10 patients sur 100)

- Perte d'appétit.
- Taux augmenté ou élevé dans le sang d'une substance graisse appelée cholestérol. Cette augmentation pourrait être constatée par une analyse de sang.
- Somnolence.
- Syndrome du canal carpien (picotements, douleur, retrait cutanément, faiblesse dans certaines parties de la main).
- Irritation, picotement ou engourdissement de la peau, par la chaleur de gaz.
- Diarrhée.
- Vomissements.
- Changement dans les résultats des tests sanguins qui renseignent sur le fonctionnement de votre foie (gamma-GT et bilirubine).
- Inflammation du foie (hépatite).
- Urticaire.
- Oedème (gonflement) du visage ou de cou ou de bras ou de jambes dans une quantité limitée.
- Augmentation des quantités de calcium dans votre sang. Si vous présentez des nausées, des vomissements et avez soif, vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmière/ne car vous devrez peut-être réaliser des tests sanguins.

Effets indésirables rares (chez 1 à 10 patients sur 10 000)

- Inflammation du foie (hépatite) qui peut inclure des plaques rouges ou des cloques.
- Éruptions cutanées causées par une hypersensibilité (cela peut être causé par une réaction allergique au anastrozole).
- Inflammation des petits vaisseaux sanguins provoquant une coloration rouge ou violette de la peau. Généralement vous trouvez articulations, des membres ou mêmes au niveau de l'estomac et des reins peuvent apparaître, comme « vasculite cutanée » ou « purpura d'Henoch-Schönlein ».

Effets sur les os

- ANASTROZOLE NEAPOLIS agit en diminuant la quantité de l'hormone appelée œstrogène présente dans votre organisme. Cet effet peut entraîner le ramollissement des os, ce qui peut provoquer parfois des fractures. Votre médecin prévoira en charge des dosages conformément aux recommandations sur les traitements pour le traitement de la santé osseuse chez les femmes ménopausées. Vous devez discuter avec votre médecin sur les risques et les options de traitement.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Conservez vos comprimés en lieu sûr hors de la portée et de la vue des enfants. Vos comprimés pourraient leur être nuisibles.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte et les plaquettes thermoformées après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour de mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé ?

La substance active est : Anastrozole.....1 mg

Les autres composants sont: Cellulose microcristalline, lactose monohydraté, povidone, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Alcool polyvinylique, dioxyde de titane, Polyéthylène glycol macrogol, Talc

Qu'est-ce que ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur

ANASTROZOLE NEAPOLIS se présente sous la forme d'un comprimé pelliculé, boîte de 30 comprimés dans des blisters en aluminium/aluminium.

Condition de prescription et de délivrance : Tableau A, liste I

A.M.M. N°:

ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, boîte de 30 : 330 213 11

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Neapolis Pharma

Route de Tunis Km 7 – 3018 Sfax/ BP 805 – Tunisie.

Tél : +216.31.338.809

Fax : +216.72.235.016 / +216.31.338.421

E.mail: neapolisadministration@neapolispharma.com

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 07/2012

أن هذا الدواء

- أبقاه مستعصم وبأي أيدي أطفاله من المستحسنات.
- أبقاه مستعصم وبأي على مسكك وإستعملكه بالكلمات بعرضت بتصفر
- أتبع بدقة وسط الجرعة وطريقة الاستعمال المنصوص عليه.
- لكن بالمقابل الصيدلاني الذي سيقدم لك بالطبيب والصيدلاني هذا الدواء بالرجوع وبالقيم وضرورة
- لكن بسبب العلاج المسببة لك من نفس تقيدك
- لكن وبالمثل عليه يعود استخدام الحبوب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

ذكر ما هو الدواء

- لا يستخدم هذا الدواء لعلاج أمراض أخرى غير تلك التي وصفت من أجلها.
- لا يعطى هذا الدواء لغيرك حتى وإن كانت لديهم أعراض مرضية مماثلة لأعراضك.
- لا تتجاوز الجرعة الموصوفة لك من طرف طبيبك أو صيدليك.
- إذا ظهرت لديك أعراض جانبية، بما فيها تلك التي لا تذكر في هذه النشرة، فيجب عليك إخبار طبيبك أو صيدليك.
- لا تتناول أدوية أخرى دون استشارة طبيبك أو صيدليك.

ضرورة الحفاظ على الدواء بعيدا عن متناول الأطفال

NEAPOLIS

NON0001 / 00

Sogim

Meilleur Qualité

2020

B.A.T

Client : NEAPOLIS Contact: Walid KHALFALLAH Désignation :ANASTROZOLE NEAPOLIS Format : 24 x 36 cm 1MG B-36 Impression : 2 couleur recto verso logiciel : Indesign CS4, Illustrator CS4, Grammage de papier : 60g Opérateur : MARWA KARRA	Date : 28-09-2020 Code article : NON000 11 Version : 00 Couleur :Pantone 293 C / 233 C Police : Swis721 Cn BT Corps : Interligne: Prepliè avec Bond 12x6.2cm fermé et ouvert F: 24x36cm	Signature client

ANASTROZOLE NEAPOLIS®

ANASTROZOLE 1 mg

Film-coated tablet - Anastrozole

Read this leaflet carefully before you start taking this medicine
This leaflet contains important information for you

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If any of the side effects gets worse, or if you notice any other side effects not listed in this leaflet, tell your doctor or pharmacist.

What is in this leaflet ?

1. What is ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet, and in which case is it used?
2. what you need to know before you take ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet ?
3. How to take ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet ?
4. Possible side effects ?
5. How to store ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet ?
6. Content of the packaging and other information.

1. WHAT IS ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet, AND IN WHICH CASE IS IT USED ?

Pharmacotherapeutic class - ATC code: L02BG03.

ANASTROZOLE NEAPOLIS contains a substance called anastrozole. It belongs to a group of medicines called "aromatase inhibitors «. ANASTROZOLE NEAPOLIS is used to treat breast cancer in menopausal women.

ANASTROZOLE NEAPOLIS works by decreasing the amount of a hormone called estrogen that your body makes. It does this by blocking a natural substance (an enzyme) from your body called "aromatase «.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet ?

Never take ANASTROZOLE NEAPOLIS

- If you are allergic to anastrozole or any of the other components of this medicine (listed in section 6).
- If you are pregnant or breastfeeding (see section « Pregnancy and breastfeeding »).

Do not take ANASTROZOLE NEAPOLIS if any of the above apply to you. If in doubt, check with your doctor or pharmacist before taking ANASTROZOLE NEAPOLIS.

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist or nurse before taking ANASTROZOLE NEAPOLIS :

- If you still have your menstrualions and if you're not a menopausal woman.
- If you are taking a medicine that contains tamoxifen or medicines that contain an estrogen (see section "Other medicines and ANASTROZOLE NEAPOLIS»).
- If you have ever had a condition that affect the strength of your bones (osteoporosis).
- If you have problems with your liver or kidneys.

If any of the above situations apply to you, or if you have any doubt, check with your doctor or pharmacist before taking ANASTROZOLE NEAPOLIS.

If you are hospitalized, tell the hospital staff that you are taking ANASTROZOLE NEAPOLIS.

Other medicines and ANASTROZOLE NEAPOLIS

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken any other medicines. This includes medicines bought without a prescription or herbal medicines. Indeed ANASTROZOLE NEAPOLIS can affect the way some medicines work, and some medicines can have an effect on ANASTROZOLE NEAPOLIS.

Do not take ANASTROZOLE NEAPOLIS if you are taking the following medicines :

- Certain medicines used to treat breast cancer (selective estrogen receptor modulators) such as medicines containing tamoxifen. These medicines may prevent ANASTROZOLE NEAPOLIS from working properly.
- An estrogen-based medicine, for example hormone replacement therapy (HRT).

If you are taking any of these medicines, ask your doctor or pharmacist for advice.

If you are taking any of the following medicines, tell your doctor or pharmacist :

- A medicine called LHRH analog (goserelin, leuprolin, gonadolin, triptorelin and ragorelin). These medicines are used for the treatment of breast cancer, certain gynecological diseases of women and cycle IVF).

Pregnancy and breastfeeding

ANASTROZOLE NEAPOLIS should not be used during pregnancy or breastfeeding. Stop ANASTROZOLE NEAPOLIS if pregnancy occurs and talk to your doctor.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Driving and using machines

ANASTROZOLE NEAPOLIS should not affect your ability to drive and use tools or machines. However, some people may occasionally experience weakness or drowsiness while taking ANASTROZOLE NEAPOLIS. In this case, ask your doctor or pharmacist for advice.

ANASTROZOLE NEAPOLIS contains lactose :

ANASTROZOLE NEAPOLIS contains lactose, which is a sugar. If your doctor has told you that you have an intolerance to some sugars, contact him before taking this medicine.

3. HOW TO TAKE ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet ?

Always take this medication exactly as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if in doubt.

- The recommended dose is one tablet per day.
- Try to take the tablet every day at the same time.
- Swallow the tablet whole with a glass of water.
- You can take the tablet with or without food.

Continue to take ANASTROZOLE NEAPOLIS for as long as your doctor or pharmacist tells you. It is a long-term treatment and you may need to take it for several years. Check with your doctor or pharmacist if in doubt.

Use in children and adolescents

ANASTROZOLE NEAPOLIS should not be given to children and adolescents.

If you take more ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg film-coated tablet than you should :

If you have taken more ANASTROZOLE NEAPOLIS than you should, tell your doctor immediately.

If you forget to take ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg film-coated tablet :

If you forget to take a dose, just take the next dose at the usual time.

Do not take a double dose (two doses of the same time) to make up for the dose you forgot to take.

If you stop taking ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet :

Do not stop taking your tablets unless your doctor tells you to.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse for more information.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS ?

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop taking ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg film-coated tablet and seek urgent medical treatment if you experience any of the following serious but very rare side effects :

- An extremely severe skin reaction with ulcers or blisters. This reaction is called "Stevens-Johnson syndrome».
- Allergic reactions (hypersensitivity) with swelling of the throat that may cause difficulty in swallowing or breathing. This reaction is called "angioedema».

Very common side effects (in more than 1 in 10 patients)

- Headache.
- Hot flashes.
- Nausea (want to vomit).
- Skin rash.
- Joint pain or stiffness.
- Inflammation of the parts (arthritis).
- Feeling weak.
- Bone loss (osteoporosis).

Common side effects (affects 1 in 10 patients in 100)

- Loss of appetite.
- Increased or elevated levels of a fatty substance called cholesterol in the blood. This increase could be seen by a blood test.
- Somnolence.
- Carpal tunnel syndrome (tingling, pain, swelling, weakness in certain parts of the hand).
- Irritation, tingling or numbness of the skin, loss / lack of taste.
- Diarrhea.
- Vomiting.
- Change in blood test results that tell you how your liver is working.
- Hair loss.
- Allergic reactions (hypersensitivity) including face, lips or tongue.
- Bone pain.
- Vaginal dryness.
- Vaginal bleeding (usually during the first few weeks of treatment - if bleeding persists, talk to your doctor).
- Muscle pain.

Uncommon side effects (affects 1 in 10 patients in 1000)

- Changes in the results of scientific blood tests that tell you how your liver is working (gamma-GT and bilirubin).
- Inflammation of the liver (hepatitis).
- Hives.
- Tipping Finger (a condition where one of your fingers or thumb locks in a bent position).
- Increased amounts of calcium in your blood. If you experience nausea, vomiting and thirst, you should tell your doctor or pharmacist or nurse because you may need to have blood tests.

Rare side effects (affects 1 in 10 patients in 10 000)

- Rare infarcts (lack of the skin which may include red patches or blisters.
- Skin rashes caused by hypersensitivity (this can be caused by allergic or drug-induced reactions).
- Inflammation of small blood vessels causing red or purple discoloration of the skin, very rarely joint disorders, pain in the stomach and kidneys may appear, known as "Henoch-Schönlein purpura" ».

Effects on bones

- ANASTROZOLE NEAPOLIS works by reducing the amount of the hormone called estrogen in your body. This effect may decrease the mineral content of your bones. Your bones may become less resistant and more susceptible to fractures. Your doctor will manage these risks according to the recommendations on treatments for the maintenance of bone health in menopausal women. You should discuss with your doctor the risks and treatment options.

Reporting side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This also applies to any side effect that is not mentioned in this leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. HOW TO STORE ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet ?

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Keep your tablets in a safe place out of the reach and sight of children. Your tablets may harm them.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton and the blisters after EXP. The expiration date refers to the last day of the month.

Store at a temperature not exceeding 30 °C.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist to dispose of the medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. CONTENT OF THE PACKAGING AND OTHER INFORMATION

What does ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet contain ?

The active substance is : Anastrozole ..... 1 mg

The other components are :

Content of tablets : lactose monohydrate, povidone, sodium carboxymethyl starch, magnesium stearate.

Coating: Polyvinyl alcohol, titanium dioxide, Polyethylene glycol / macrogol, Talc

What does ANASTROZOLE NEAPOLIS 1 mg, film-coated tablet look like and content of the outer packaging

ANASTROZOLE NEAPOLIS is in the form of a film-coated tablet, box of 30 tablets in blisters aluminum / aluminum.

Supply and prescription Condition : Table A/bis 1

M. A. N° :

ANASTROZOLE NEAPOLIS 1mg, box of 30 : 939 313 19

Marketing authorization holder and manufacturer

Neapolis Pharma

Tunis-Nord Km 7 - 1053B Sidi el Béchir - Tunisia.

Tel : +216.31.336.400

Fax : +216.72.235.816 / +216.31.336.421

E.mail: neapolisfarma@neapolispharma.com

This leaflet was last reviewed : 07/2019

THIS IS A MEDICINE

- A medicine is not like other consumer goods.
- A medicine is a product that affects your health and its consumption without compliance to the prescription exposes you to danger.
- You should strictly follow your doctor's prescription and directions for use, as well as the advice of your pharmacist.
- Your doctor and your pharmacist are familiar with the medication, its indications and contraindications.
- Do not stop treatment on your own during the prescribed period.
- Do not exceed, do not remake doses without consulting your doctor.

KEEP MEDICINES OUT OF THE REACH OF CHILDREN

NEAPOLIS

Sogim
Meilleur Qualité

2020

B.A.T

Client : NEAPOLIS Contact: Walid KHALFALLAH Désignation :ANASTROZOLE NEAPOLIS Format : 24 x 36 cm 1NG B-30 Impression : 2 couleur recto verso logiciel : Indesign CS4, Illustrator CS4, Grammage de papier : 60g Opérateur : MARWA KARRA	Date : 28-09-2020 Code article : NON000 11 Version : 00 Couleur :Pantone 293 C / 233 C Police : Swis721 Cn BT Corps : Interligne: Preplié avec Bond 12x6.2cm fermé et ouvert F: 24x36cm	Signature client