

MP[®] 20 mg - MP[®] 40 mg - MP[®] 500 mg

L'ophtalmit et solution pour usage parentéral Méthylprednisolone

Vous lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Cette notice a été conçue pour vous permettre d'être au courant de la prise.
- Si vous avez d'autres questions, et vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que MP, l'ophtalmit et dans quel cas en a-t-on utilisé ?
2. Quelles sont les indications à connaître avant d'utiliser MP, l'ophtalmit ?
3. Comment prendre MP, l'ophtalmit ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MP, l'ophtalmit ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MP, l'ophtalmit et solution pour usage parentéral ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
CORTICOIDES A USAGE SYSTEMIQUE NON ASSOCIES

Indications thérapeutiques
MP 20 et MP 40 :
Les indications sont celles de la corticothérapie générale par voie orale, lorsque la voie parentérale est nécessaire en cas d'impossibilité de la voie orale (vomissements, agitation gastrique, troubles de la mastication).

Epidémiologie : essentiellement croisés ou de thrombophiles septiques, de fibres typhoïdes sévères, en particulier avec confusion mentale et coma, de tuberculose en complément de traitement antibiotique spécifique, de laryngite aiguë atrophique chez l'adulte.

Contre-indication : traitement palliatif des leucémies et des lymphomes, des myélomes multiples, de nombreux cancers, et comme traitement anti-inflammatoire au cours des chimiothérapies, notamment associées avec hyperuricémie.

Néphrologie : Corticoïdes glucocorticoïdes et syndromes néphrotiques, collagénoses et connectivites.

Allergologie : état allergique sévère, œdème de Quincke, choc anaphylactique.

Endocrinologie : hypercalcémie paraneoplasique.

Rhumatologie : purpura thrombocytopénique idiopathique (immunitaire), localisés par voie IV.

Neurologie : œdème cérébral, naturel ou traumatique, traitement palliatif des tumeurs de la moelle de Bannett.

ORL : œdème laryngé laryngite infectieuse, épiglottite, dysphagie.

Pathologie : état de mal métabolique.

Transplantation d'organes.

MP 500 :

Les indications sont celles de la corticothérapie par voie générale, lorsque des problèmes sont identifiés, en particulier :

- Manifestations extra rénales de certaines maladies systémiques LED (après élimination des causes).

- Traitement d'attaque de certaines glomérulopathies associées ou non à une maladie systémique en cas d'échec d'un traitement oral.

- Crises vasculaires récurrentes en association éventuelle aux traitements immunosuppresseurs.

- Transplantation d'organes (cellules souches hématopoïétiques allogénes).

- Traitement de réjet de greffe.

- Traitement de la réaction de greffe contre l'hôte.

REVELER SON N° LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MP, l'ophtalmit et solution pour usage parentéral ?

Contre-indications
N'utilisez jamais MP, l'ophtalmit dans les cas suivants :

- La plupart des infections.

- Certaines maladies virales en évolution (hépatite virale, kerpis, varicelle, zona).

- Certains troubles mentaux non traités.

- Vaccination par des vaccins vivants.

- Allergie à l'un des constituants.

- Troubles de la coagulation ou traitement anticoagulant en cours, en cas d'injection intramusculaire.

- Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALLEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sans avis préalable de votre médecin, en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (voir la rubrique **Prise en situation d'urgence**).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec MP, l'ophtalmit et solution pour usage parentéral.

Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous étroite surveillance médicale.

AVANT LE TRAITEMENT

Prévenez votre médecin en cas d'allergie, de vaccination récente, ou en cas d'échec digestif de maladies de l'intestin, d'antécédents chirurgicaux récents ou récents de diabète, d'hypertension artérielle, d'infarctus (notamment antérieurs de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de syndrome grave (maladie des ossements avec fatigue musculaire).

Prévenez votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou le mal de l'étranger, en l'absence de risque de maladie parasitaire.

PENDANT LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence

APRÈS LE TRAITEMENT

Evitez le contact avec les yeux sursensibles de varicelle ou de rougeole.

Pendant le traitement

Les corticoïdes sous ou injectés peuvent favoriser l'apparition de mycoses, virus de l'herpès, troubles de l'immunité (infections), Prévenez votre médecin en cas d'apparition de diabète transitoire.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement par voie intraveineuse ou intramusculaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise en situation d'urgence



6 192405 000471

MP 20 mg - MP 40 mg - MP 500 mg

L'ophtalmit et solution pour usage parentéral Méthylprednisolone

Vous lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Cette notice a été conçue pour vous permettre d'être au courant de la prise.
- Si vous avez d'autres questions, et vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que MP, l'ophtalmit et dans quel cas en a-t-on utilisé ?
2. Quelles sont les indications à connaître avant d'utiliser MP, l'ophtalmit ?
3. Comment prendre MP, l'ophtalmit ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MP, l'ophtalmit ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MP, l'ophtalmit et solution pour usage parentéral ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
CORTICOIDES A USAGE SYSTEMIQUE NON ASSOCIES

Indications thérapeutiques
MP 20 et MP 40 :
Les indications sont celles de la corticothérapie générale par voie orale, lorsque la voie parentérale est nécessaire en cas d'impossibilité de la voie orale (vomissements, agitation gastrique, troubles de la mastication).

Epidémiologie : essentiellement croisés ou de thrombophiles septiques, de fibres typhoïdes sévères, en particulier avec confusion mentale et coma, de tuberculose en complément de traitement antibiotique spécifique, de laryngite aiguë atrophique chez l'adulte.

Contre-indication : traitement palliatif des leucémies et des lymphomes, des myélomes multiples, de nombreux cancers, et comme traitement anti-inflammatoire au cours des chimiothérapies, notamment associées avec hyperuricémie.

Néphrologie : Corticoïdes glucocorticoïdes et syndromes néphrotiques, collagénoses et connectivites.

Allergologie : état allergique sévère, œdème de Quincke, choc anaphylactique.

Endocrinologie : hypercalcémie paraneoplasique.

Rhumatologie : purpura thrombocytopénique idiopathique (immunitaire), localisés par voie IV.

Neurologie : œdème cérébral, naturel ou traumatique, traitement palliatif des tumeurs de la moelle de Bannett.

ORL : œdème laryngé laryngite infectieuse, épiglottite, dysphagie.

Pathologie : état de mal métabolique.

Transplantation d'organes.

MP 500 :

Les indications sont celles de la corticothérapie par voie générale, lorsque des problèmes sont identifiés, en particulier :

- Manifestations extra rénales de certaines maladies systémiques LED (après élimination des causes).
- Traitement d'attaque de certaines glomérulopathies associées ou non à une maladie systémique en cas d'échec d'un traitement oral.
- Crises vasculaires récurrentes en association éventuelle aux traitements immunosuppresseurs.
- Transplantation d'organes (cellules souches hématopoïétiques allogénes).
- Traitement de réjet de greffe.
- Traitement de la réaction de greffe contre l'hôte.

REVELER SON N° LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MP, l'ophtalmit et solution pour usage parentéral ?

Contre-indications
N'utilisez jamais MP, l'ophtalmit dans les cas suivants :

- La plupart des infections.
- Certaines maladies virales en évolution (hépatite virale, kerpis, varicelle, zona).
- Certains troubles mentaux non traités.
- Vaccination par des vaccins vivants.
- Allergie à l'un des constituants.
- Troubles de la coagulation ou traitement anticoagulant en cours, en cas d'injection intramusculaire.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALLEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sans avis préalable de votre médecin, en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (voir la rubrique **Prise en situation d'urgence**).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec MP, l'ophtalmit et solution pour usage parentéral.

Mises en garde spéciales

MP[®] 20 mg - MP[®] 40 mg - MP[®] 500 mg
 Lyoophilate and solvent for injection Methylprednisolone

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

1. What MP is and what it is used for?
2. Before you take MP?
3. How you take MP?
4. Possible side effects?
5. How to store MP?
6. Further information

1. What MP Lyophilisate and solvent for injection is and what it is used for?

Pharmacotherapeutic group:
 CORTICOID FOR SYSTEMIC USE. NOT ASSOCIATED
Therapeutic Indications:
 MP 20 and MP 40 :

- The indications are those of the general oral corticosteroids when the parenteral route is necessary in case of impossibility of oral route (vomiting, gastric aspiration, impaired consciousness).
- Infectious Diseases: basically some cases of acute thrombophlebitis, severe typhoid fever, particularly with shock, mental confusion and coma; Tuberculosis in complement to specific etiological treatment; acute orchitis; laryngitis in children.
- Cancer palliative treatment of leukemias and lymphomas, multiple myeloma, many sarcomas, and an adjuvant treatment during chemotherapy, bone metastases with hypercalcemia.
- Nephrology: Some glomerulonephritis and nephrotic syndrome, collagenosis and connective tissue diseases.
- Allergies: severe allergic rhinitis, Quinck's edema, anaphylactic shock.
- Endocrinology: postoperative hypoadrenalism.
- Hematology: idiopathic thrombocytopenic purpura (autoimmune), only IV.
- Neurology: tumoral, traumatic or brain edema, palliative treatment of tumors of the Brainerd disease;
- O.R.L.: laryngeal edema, suffocating laryngitis, epiglottitis, dysphagia.
- Pulmonology: status asthmaticus;
- Organ Transplantation.

MP 500 :

- The indications are those of corticosteroids, when dosages are needed in pediatric:
 - Extra renal manifestations of certain systemic diseases: systemic lupus erythematosus (LE) in case of failure of corticosteroids in usual dose.
 - Attack Treatment of certain glomerular diseases associated or not to a systemic disease in case of failure of usual therapy.
 - Some necrotizing vasculitis in eventual association with plasma exchange.
 - Organ transplantation and allogeneic hematopoietic stem cells.
 - Treatment of transplant rejection;
 - Treatment of the graft reaction against the host.
- 2. Before you take MP:**
- Contraindications:**
 Do not take MP if:
- Most infections
 - Some viral diseases in evolution (viral hepatitis, herpes, varicella, zoster)
 - Some untreated fungal diseases,
 - Vaccination with live vaccines
 - Allergy to one of the components,
 - Coagulation disorders or anticoagulant therapy, in case of intramuscular injection.

This drug SHOULD GENERALLY NOT BE USED, unless otherwise advised by your doctor, in combination with drugs that may give some cardiac rhythm disorders (see Taking or using other medicines).

IF IN DOUBT, ASK THE ADVICE OF YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

Be Take special care with MP.

This drug should be taken under strict medical supervision.

BEFORE THE TREATMENT:

Tell your doctor if you are allergic to several vaccines, in case of digestive ulcer, colon disease, recent surgery in the intestine, diabetes, high blood pressure, infection (including history of tuberculosis), liver failure, kidney failure, osteoporosis and severe myopathies (muscle disease with muscle fatigue).

Notify your doctor if you are in the tropical or subtropical regions and southern Europe, because of the risk of parasitic disease.

AFTER THE TREATMENT:

Avoid contact with individuals with varicella or measles.

DURING TREATMENT:

Oral or injectable steroids can promote the onset of candidiasis or yeast sprouts (exceptional). Notify your doctor if onset of tendon pain.

Precautions of use:

During treatment with intravenous or intramuscular injection, your doctor may advise you to follow a diet, especially low in salt.

IF IN DOUBT, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

Using or using other medicines:

TO AVOID POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN SEVERAL medicines, including some medicines that may provoke heart rhythm disorders, amiodarone, bepridil, erythromycin intravenous injection, halofentanyl, pentamidine, sparfloxacin, subopride, terfenadine, ritonavir, ALWAYS INFORM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST OF ANY OTHER CONCOMITANT TREATMENT.

Interactions with food and drink:

Without object.

Interactions with alternative therapies or herbal remedies:

Without object.

Use during pregnancy and lactation:

Pregnancy :

This drug should be used during pregnancy only if necessary.

If you discover you are pregnant during treatment, consult your doctor so only he can judge the need for further treatment.

Breast-feeding:

Breastfeeding should be avoided during treatment because of the passage into breast milk.

Ask your doctor or pharmacist before taking any drug.

Sports :

Warning: this product contains methylprednisolone which is on the doping list.

Effects on ability to drive and use machines:

Without object.

This is a medicine:

- A medicine is a product that affects your health and its consumption without compliance to the prescriptions exposes you to danger.

- Always follow your doctor's prescription and directions for use, follow the advice of your pharmacist.

- Drug doses and pharmacokinetic profiles vary with the medicine, its indication and administration.

- Dispose any treatment in your own cabinet or during the prescribed period.

- Do not take it again, do not increase the dose without consulting your doctor.

Important information about some of the ingredients of MP:

Sugar intolerance - the 40 mg vial of MP 20 mg contains a sugar called lactose.

If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, tell your doctor before taking this medicine.

3. How you take MP

Instructions for proper use:
 without object.

Dosage, Mode and / or route (s) of administration, frequency of administration and Duration of treatment:

Dosage :

The dose to use is determined by your doctor based on your weight and the treated disease.

It is strictly individual.

Administration route:

Route : INTRAVENOUS (by slow injection or infusion) deep intramuscular.

The suitable solvent for reconstitution of MP lyophilisate and dilution for parenteral use is only water for injection.

MP lyophilisate and solution for injection should be reconstituted with 2 ml of water for injection.

Duration of treatment :

It is determined by your doctor.

Symptoms and instructions in case of overdose:

without object.

Instructions in case of failure of use or more doses:
 without object.

Risk of withdrawal syndrome:

without object.

4. Possible side effects

Description of side effects

Like all drugs, MP lyophilisate and solution for injection can cause side effects, although everyone reacts in an individual way.

This essential drug is usually well tolerated when recommendations given by your doctor are followed (see Precautions).

It can cause, depending on the dose and the duration of treatment, more or less bothersome effects.

The most frequently encountered are:

- Swelling and redness of the face, weight gain,
- appearance of hives,
- Elevated blood pressure,
- Insomnia, sleeping disorders,
- Bone fragility,

- Some cases of trunk rigidity have been exceptionally described, particularly in co-prescription with fluoxetine.

- Modification of certain biological parameters (salt, sugar, potassium) may require a diet or additional treatment.

Other effects, much rarer, were observed:

- risk of inadequate secretion of the adrenal gland,
- growth trouble in children,
- menstrual disorders,
- weakness of muscles,
- bloating, ulcers and other digestive disorders,
- skin disorders

- Some forms of glaucoma (increased pressure inside the eye) not contract (swelling of the lens).

Some effects related to the route of administration have been described: allergic reactions, heart rhythm disorders.

This is a Medication.

- Medication is a product which affects your health and its consumption contrary to intention can be dangerous for you.

- Follow strictly the doctor's prescription, the number of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.

- The doctor and the pharmacist are experts in medicine its benefits and risks.

- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.

- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

- Keep all medicines out of reach of children.

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, health care provider or pharmacist.

5. How to store MP

Keep out of the reach and sight of children.

Expiration date:

Do not use MP lyophilisate after the expiry date stated on the packaging.

Storage conditions :

MP 20 and MP 40 : No special storage conditions.

MP 500 : To store at a temperature not exceeding 25°C.

If necessary, wearing against certain visible signs of deterioration.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. Further information

What MP contains:

MP 20 mg	MP 40 mg	MP 500 mg
23.24 mg (70 mg)	46.48 mg (140 mg)	464.8 mg (1400 mg)

What MP looks like and contents of the pack:

MP 20, Lyophilisate and solvent for injection is presented in a type I glass vial. Unit pack containing 1 vial + 1 ampoule of solvent of 2 ml.

MP 40, Lyophilisate and solvent for injection is presented in a type I glass vial. Unit pack containing 1 vial + 1 ampoule of solvent of 2 ml.

MP 500, Lyophilisate and solvent for injection is presented in a type I glass vial. Unit pack containing 1 vial + 1 ampoule of solvent of 5ml.

MP 500, Lyophilisate and solvent for injection is presented in a type I glass vial. Unit pack containing 10 vials.

MP 20 - M.A. N° 923 323 3

MP 40 - M.A. N° 923 323 1

MP 500 - M.A. N° 923 323 3

MP 500 Box of 10 vials - M.A. N° 923 223 40

Delivery conditions :

List 1

Marketing Authorization Holder and Manufacturer:

LES LABORATOIRES MEDIS

Road of Tunisia - KM 7 - BP 206 - 8004 Nabeul - Tunisia

Tel : +216 72 25 50 06. Fax : +216 72 25 50 16

E-mail : contact@labmedis.com

This leaflet was last approved in: 02/2021

